

Hormonale Beeinflussung der Legetätigkeit beim Huhn

von

Walter Eufinger

Oberlahnstein a. Rhein, Hessen-Nassau

1930.

Hormonale Beeinflussung der Legetätigkeit beim Huhn

Vorgelegt von

Walter Eufinger

aus Oberlahnstein a. Rhein, Hessen-Nassau

Gedruckt mit Genehmigung
der Fakultät.

Referent: Prof. R. Abelein.



In Versuchen an Legehühnern hat Koch (9) durch Injektionen kleiner Mengen von Prolan die Legetätigkeit anregen können. Herr Dozent Dr. W. Koch beauftragte mich, dieses Verfahren an einer größeren Zahl von Tieren in landwirtschaftlichen Betrieben nachzuprüfen und dabei besonders die Frage zu berücksichtigen, ob die Durchführung wirtschaftlich möglich ist, und ob auf diesem Wege die Leistungsfähigkeit unserer Geflügelzucht in erheblichem Ausmaß gesteigert werden kann.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
I. Einleitung	I
II. Behandlungstechnik	7
III. Die Versuche I—V	9
IV. Vergleichende Betrachtung der Versuchsergebnisse	42
V. Zusammenfassung	46
VI. Literaturverzeichnis	47

I. Einleitung.

HVGH und Prolan.

Die Geschlechtsvorgänge des Organismus werden im wesentlichen hormonal gesteuert. Die die Geschlechtsentwicklung beeinflussenden Inkrete werden als Geschlechtshormone bezeichnet. Die heute bekannten Geschlechtshormone sind das brunsterregende Eierstockshormon oder *Follikelhormon*, das *Hormon des gelben Körpers des Eierstockes* und die *Testikelhormone*. Sie haben in der großen Zahl der mehr oder weniger bekannten Hormone für die Veterinärmedizin die größte praktische Bedeutung erlangt.

Aus der *Hypophyse* sind mehrere Hormone bekannt geworden, die ihrerseits die Tätigkeit anderer Hormondrüsen regeln. Eines von diesen Hormonen, das als „*gonatropes Hormon*“ oder „*Geschlechtshormon des Hypophysenvorderlappens*“ (HVGH)*) bezeichnet wird, ist der Tätigkeit der Keimdrüsen in beiden Geschlechtern übergeordnet. Es bewirkt beim weiblichen Tier die Geschlechtsreife, die Brunstveränderungen am Ovar, sowie die Ausstoßung des Eies und die Bildung des gelben Körpers. Im männlichen Geschlecht bewirkt das HVGH den Descensus**) und die Pubertätsentwicklung des Hodens. Auch hier wird, wie am Ovar, ausschließlich der generative Anteil der Keimdrüse beeinflusst (Hodenkanälchen). Später werden durch das HVGH Spermiogenese und Bildung des Hodenhormons angeregt.

*) Das Geschlechtshormon des Hypophysenvorderlappens wird im Folgenden abgekürzt: HVGH.

**) Verlagerung der Hoden während der Embryonalentwicklung an ihren endgültigen Platz.

Das HVGH wird nach *Berblinger* (1), *Fels*, *Lehmann*, *Zondek* u. a. in den basophilen Zellen des Hypophysenvorderlappens gebildet.

Abgesehen vom HVGH werden in der Hypophyse noch eine Reihe von Hormonen gebildet, die Geschlechtsvorgänge beeinflussen; bedeutungsvoll sind insbesondere das *Laktionshormons des HVL* und das im Hinterlappen gebildete *Oxytocin*.

Zondek und *Afshheim* fanden im Harn schwangerer Frauen einen Stoff, der mit dem HVGH in seiner Wirksamkeit nahezu übereinstimmt. Dieses im Harn schwangerer Frauen in großen Mengen anzutreffende Hormon ist heute unter dem Namen „*Prolan*“ bekannt. Es ist jedoch nicht, wie man früher annahm, das in den Harn ausgeschüttete HVGH, sondern ein diesem Hormon sehr ähnlicher Stoff, der wahrscheinlich in der Plazenta gebildet wird.

Die Wirkung von Prolan bei Säugern.

In der Pubertät bewirkt das HVGH erstmals die Vergrößerung von Eianlagen. Diese Entwicklung führt zur Bildung von Eibläschen, von Follikeln. In der Wandung dieser sich vergrößernden Follikel wird das Follikelhormon gebildet, das in der Follikelflüssigkeit größerer Eianlagen in großen Mengen zu finden ist. Unter dem Einfluß dieses Hormones entstehen die weiblichen sogenannten sekundären Geschlechtsmerkmale. Das Follikelhormon bewirkt in der Pubertät insbesondere die Entwicklung des Geschlechtstraktes, der Milchdrüse und der weiblichen Körperformen.

Bei der Brunst werden unter dem Einfluß des HVGH eine oder einige Eianlagen bis zur Reife entwickelt. Das infolge dieser Wirkung entstehende Follikelhormon bewirkt die Brunsterfcheinungen.

Weiterhin vollzieht sich die Ausstoßung des ausgereiften Follikel unter der Einwirkung des HVGH. Mit der Ovulation ist die Möglichkeit einer Befruchtung geschaffen.

Auch die Bildung des gelben Körpers geschieht unter dem Einfluß des Gehirnanhanges, und zwar spricht man diesen Vorgang der luteinisierenden Komponente des HVGH zu (*Prolan B*), das von vielen Autoren von dem Follikelreifungshormon des Gehirnanhanges (*Prolan A*) abgetrennt wird. Die Entstehung des Gelbkörpers schafft wieder ein neues Hormon, das *Corpus luteum-Hormon* oder *Lutein*, das durch seine den Uterus morphologisch verändernde Wirkung das Festhalten des befruchteten Eies im Uterus und damit die Schwangerschaft ermöglicht.

Eine weitere Aufgabe des Luteins besteht in der vorübergehenden Hemmung der Hypophysentätigkeit, um während der Schwangerschaft weitere Befruchtungsmöglichkeiten auszuschalten. Die Entwicklung der Milchdrüse während der Trächtigkeit beruht ebenfalls teilweise auf der Wirkung des Luteins.

Aehnlich den Veränderungen am Ovar laufen auch die Entwicklungsphasen an der männlichen Keimdrüse unter dem Einflusse des HVGH ab. Schon der Descensus wird von diesem Hormon verursacht. Entsprechend der Follikulinbildung entsteht im Hoden zur Zeit der Geschlechtsreife unter dem Einfluß der Hypophyse das *Hodenhormon* oder *Testikelhormon*, das zur Zeit der Geschlechtsreife zur Entstehung der sekundären Geschlechtsmerkmale und zum Beginn der Geschlechtsfunktion führt.

Die Indikationen von Prolan bei Säugern.

In der Reihe der heute in der Veterinärmedizin gebräuchlichen Hormonpräparate mit gonadotroper Wirkung hat *Prolan* in der Praxis vielfältig Verwendung gefunden.

Die Literaturangaben entnehme ich der Zusammenstellung von Koch (10).

Als besonderes Indikationsgebiet mit praktischer Bedeutung ist die Brunstschwäche unserer Zucht- und Nutztiere zu nennen. Bei Rind und Pferd konnte schon mit verhältnismäßig kleinen Dosen Brunstschwäche sowie ovarielle Sterilität in vielen Fällen bekämpft werden, während bei Schwein und Schaf die Meinungen über die Wirksamkeit noch auseinander gehen.

Bei Hündinnen waren durch Prolan lediglich Brunstteilsymptome hervorzurufen, während volle Brunst und Befruchtungsfähigkeit ausblieben.

Bei Kaninchen und Kamelen löst Prolan eine künstliche Ovulation aus, die bei ersteren nach künstlicher Befamung zu Fruchtbarkeit führte.

Auch die männliche Unfruchtbarkeit wurde in manchen Fällen durch Prolan mehr oder weniger behoben. So gelang bei Bullen, Katzen und Silberfüchsen durch Prolan eine vorübergehende Anregung der Potenz.

Auch eine Steigerung der Milchleistung wurde mit Prolan versucht. Einzelne günstige Ergebnisse konnten aber durch eingehende Nachprüfungen nicht bestätigt werden.

Die bei Ueberdosierung der Geschlechtshormone auftretenden Störungen der Ovarialfunktion hat Koch zur Bekämpfung der krankhaften Brunft bei Hund und Katze ausgewertet, indem er durch wiederholte Gaben von etwa 100 RE*) Prolan eine unerwünschte Brunft unterdrückte. Diese Behandlungsmöglichkeit ist durch Verwendung von Prolan in öligem Lösung verbessert worden.

Prolan in Öl wurde auch gegen die Nymphomanie der Kühe, sowie zur Brunftunterdrückung bei Mastschweinen verwendet.

Witzigmann erzielte durch Prolan bei *Dermatosen* (Hautkrankheiten), die auf sexuelle Störungen zurückzuführen waren, Besserungen und in vielen Fällen Heilung.

Die Indikation von Prolan beim Menschen.

In der Humanmedizin ist die Verwendungsmöglichkeit des Prolan geringer als in der Veterinärmedizin. Vor allem erstreckt sich seine Anwendung auf die Behandlung krankhafter Blutungen im Genitalapparat. Bei mancherlei durch mangelhafte Wirkung der erhaltenen Keimdrüsen bedingten krankhaften Veränderungen sowie durch mangelhafte Rückbildung der Ovarien hervorgerufene Störungen im Klimakterium wurde Prolan verwendet. Auch bei der hypophysären Fettucht, der Fröhlich'schen Krankheit des Menschen, konnte durch Prolanbehandlung Erfolg beobachtet werden. Als wertvolles und zuverlässiges Heilmittel hat sich Prolan zur Behandlung der Hodenverlagerung beim Menschen erwiesen. Ähnlich den Erfolgen, die Witzigmann bei Dermatosen der Hündinnen im Anschluß an Gravidität durch Prolanbehandlung erzielte, konnte auch bei krankhaftem Hautjucken als Begleiterscheinung von Geschlechtsreife, Schwangerschaft oder Klimakterium beim Menschen Prolan Anwendung finden.

Die Wirkung von Prolan bei Vögeln.

Auch bei den Vögeln entfaltet das HVGH oder das Prolan eine anregende Wirkung auf das Keimepithel der Geschlechtsdrüsen, die zur Reifung führt. Doch ist die Wirkung des sich unter dem Einfluß des HVGH bildenden Follikelhormones eine andere als bei den Säugetieren, da bei Vögeln keine Brunft vorhanden ist. Auch eine Wirkung des

*) RE = Ratteneinheiten. RE Prolan = Menge, welche bei jungfr. Ratten Brunftercheinungen hervorruft.

Gelbkörperhormones ist bei Vögeln unbekannt. Wohl fanden *Stieve* und *Hett* im Ovar der Vögel gelbe Körper; diese stimmen morphologisch mit dem *Corpus luteum* der Säugetiere überein, sind aber in ihrer Bedeutung noch nicht erforscht.

Die bei Vögeln wesentlichen Vorgänge der Geschlechtsfunktion, die Eireifung, die Abstoßung des Eies und damit die Möglichkeit der Befruchtung sind von dem HVGH beeinflusst. Diese unterschiedliche Beeinflussbarkeit ist in den verschiedenen Entwicklungsstufen der Keimdrüsen sehr verschieden und diese Verschiedenheit ist bei den Vögeln bedeutend ausgeprägter als bei den Säugetieren (*Koch* (9)). Auch ist die Wirkung des Prolan wesentlich anders als die der Extrakte des HVL.

Die anregende Wirkung des HVGH oder des Prolan auf die Keimepithelien der Geschlechtsdrüsen wurde beim Hausgeflügel wiederholt Gegenstand von Untersuchungen, die unter anderem Kenntnisse über die Möglichkeit einer Beschleunigung der Geschlechtsreife bringen sollten.

Durch Verabreichung von HVL-Extrakten konnte die jugendliche weibliche Keimdrüse nicht angeregt werden (*Hogben, Mitchell, Renoult, Lang, Vacek*). Eine Anregung, die aber nie zu Geschlechtsreife führte, erzielten *Domm* (3) und *Riddle*.

Völlig ergebnislos verliefen Versuche mit Prolan an der jugendlichen Keimdrüse. Es kam weder zu einer Geschlechtsreife noch zu einer Anregung der noch jugendlichen weiblichen Keimdrüse. *Zondek, Kamenicek* (6) und *Koch* (9) zeigten dies bei Hühnern, *Riddle* und *Tange* und *Zondek* bei Tauben.

Im männlichen Geschlecht ist die Empfindlichkeit der im Entwicklungsstadium befindlichen Keimdrüsen gegenüber hormonalen Einflüssen im allgemeinen geringer. Durch HVL-Extrakt konnte eine Vergrößerung der Hoden und Anregung des Keimepithels erreicht werden (*Domm* (2), *Domm* und *van Dyke, Riddle* und *Flemion, Riddle* und *Polhemus, Schockaert, Hogben*), während Prolaninjektionen bei Hühnern (*Reiß, Pick* und *Winter*), bei Tauben (*Riddle* und *Tange*) und Enten (*Schockaert*) ergebnislos verliefen.

Bei erwachsenen Tauben brachten Injektionen von HVL-Extrakt (*Riddle* und *Flemion*) sowie Prolaninjektionen (*Evans* und *Koch* (9)) eine Vergrößerung der Hoden und gleichzeitig Anregung der Keimepithelien.

Erheblich größer ist die Empfindlichkeit des Ovars geschlechtsreifer, legender Hennen. Durch Verfütterung von Trockenpulver des HVL

konnten *Clark* und *Gutowska* die Legetätigkeit geschlechtsreifer Hennen steigern, während *Simpson* und *Lang* keinen Erfolg sahen. Einspritzung von Extrakten des HVL, versucht von *Walker*, *Noether* (11, 12) und *Renoult* führten selbst bei kleinsten Dosen (*Walker*) zu Unterbrechung der Legetätigkeit und Schädigung des Ovars durch Atresie und Luteinifizierung von Follikeln. Implantierte HVL brachten senile Hennen wieder zur Aufnahme der Legetätigkeit (*Dubowik*). *Pearl* und *Surface* konnten dagegen durch Injektion von HVL-Extrakt die Legetätigkeit nicht anregen.

Mit Prolan führte erstmals *Wehner* (13) in dieser Richtung Versuche durch, indem er große Dosen Prolan an Hennen verfütterte. Er konnte die Legtätigkeit der Hennen steigern, doch war der Erfolg nicht wirtschaftlich.

Durch Injektionen von Prolan bei normallegenden Hennen konnten weder *Koch* (8, 9) noch *Noether* (11) die Legeleistung erhöhen. *Noether* (11) fand, daß Injektionen von Prolan nicht wie in seinen Versuchen mit HVGH zu Schädigung der weiblichen Keimdrüse führen. *Koch* (7, 9) hatte mit Injektionen von 12,5 RE Prolan bei Hennen, deren Legetätigkeit durch schädigende Umwelteinflüsse unterbrochen worden war, gute Erfolge, wenn der schädigende Faktor, der zur Unterbrechung geführt hatte, beseitigt war.

Auch zur beliebigen Erzeugung oder Unterbrechung der *Brütigkeit* glaubte man die Hormone dienstbar zu machen. *Podhardsky* und *Wodzicki* versuchten dies unter anderem mit Prolan, erreichten aber nur eine Unterbrechung der Legetätigkeit. Mit den Dosen von Prolan, die mit Wiedereinsetzen der Legetätigkeit auf sistierende Hennen reagieren, versuchte *Eigemann* die Brütigkeit dieser Hennen zu beseitigen, doch ein Erfolg war nicht gegeben. Dagegen gelang es *Kiddle* und *Bates* mit „Prolaktin“, dem spezifischen, die Laktation anregenden Hormon des HVL, Brütigkeit auszulösen.

Es zeigt sich demnach, daß bei Vögeln HVL-Extrakte die weibliche Keimdrüse vorwiegend schädigen, während Prolan, wenn überhaupt, auf das Ovar fördernd wirkt.

Bei Säugetieren bewirken HVGH-Überdosierungen ausgedehnte Luteinifizierung des Eierstockes. Bei Vögeln zeigt sich dagegen nur eine Luteinifizierung der Eibläschen oder lediglich Rückbildung der Eier. Dieser Unterschied in der Wirkung ist nach *Koch* möglicherweise in der Verschiedenheit im Aufbau des Ovars dieser beiden Tierklassen zu suchen

oder durch eine unterschiedliche Abhängigkeit der Luteinifurierung von HVGH bei Vögeln und Säugern zu erklären.

II. Behandlungstechnik.

Zum weiteren Ausbau der Erfahrungen, die Koch (9) durch seine oben erwähnten Versuche über die hormonale Beeinflussung der Legeleistung durch „Prolan“ bei Hühnern erzielte, führte ich im Jahre 1937 einige Versuche mit verschiedenen Prolanlösungen durch, die größere Tierbestände umfaßten. Die Untersuchungen wurden nur in staatlich anerkannten Geflügelzuchten angestellt. Solche Betriebe sind mit Fallennestern ausgestattet, die eine genaue Kontrolle der Legeleistung einer jeden Henne ermöglichen. Die Eintragungen der Eier erfolgen in vorschriftsmäßig zu führende Legelisten, so daß ein Ueberblick über den Leistungszustand der Hennen auch nach Ablauf eines Monats noch möglich ist. Somit ist die für eine diesbezügliche Untersuchung erforderliche Genauigkeit gewährleistet.

Die einzelnen Versuche gestalteten sich in ihrer technischen Durchführung ziemlich gleichmäßig.

Die Tiere wurden abends, als sie sich bereits auf den Sitzstangen im Schlafraum befanden, gefangen und gleich behandelt. Vor der Behandlung wurden in reinen Gefäßen die einzelnen Prolanlösungen ausreichend für die verschiedenen Behandlungsformen hergestellt. Zur Injektion wurden 5 ccm und 10 ccm Spritzen verwandt, so daß bei einer Gabe von 0,5 ccm Lösung pro Henne 10, resp. 20 Tiere mit einer Spritzenfüllung behandelt werden konnten. Der Einstich der Nadel erfolgte zweckmäßig in die Brustmuskulatur, weil das Federkleid hier am wenigsten stört.

An Hand seiner Erfahrungen über Prolaninjektionen bei Hühnern glaubt Wehner (13) in der Hauptsache die Behandlungsweise für aufgetretene Mißerfolge verantwortlich machen zu müssen. Wehner spricht sich zwar für die Anwendungsmöglichkeit einer Injektionsbehandlung aus, bezweifelt aber dabei auf Grund seiner Erfahrungen die Wirtschaftlichkeit. Daß besonders das Ovar der Hühner sehr stark auf äußere Reize reagiert, ist hinreichend bekannt und in seinen Ausmaßen schon wiederholt nachgewiesen worden. So werden auch das Einfangen und die darauf folgende Injektion einen schädigenden Einfluß auf den Eierstock ausüben, das Allgemeinbefinden und die Fortpflanzungsfähigkeit der Hennen nachteilig beeinflussen. Diese Umstände reichen aus, eine wiederholte Injektion zu verbieten. Um diese Uebelstände einer sonst praktischen Behandlungsweise auch bei einmaliger Injektion auszuschalten, führte ich die Behandlungen abends durch und erreichte, daß die Tiere halb

schlafend zur Injektion kamen. Von einem Einfangen der Tiere konnte hier überhaupt nicht mehr gesprochen werden, die Hennen wurden mehr oder weniger schlafend von den Stangen gegriffen. Trotzdem konnte auch ich bei den behandelten Hennen in bestimmten Fällen auftretende nachteilige Wirkungen nur durch die Behandlung erklären. Solche Fälle traten aber nur bei normal legenden Hennen auf, bei denen eine Leistungssteigerung nach den Ergebnissen von Koch (9) nicht zu erwarten ist.

Als Untersuchungszeit wurden in der Regel 4 Wochen nach dem Behandlungstage abgewartet, um dann das Behandlungsergebnis den genau geführten Legelisten zu entnehmen. An Hand von Kurven über den Verlauf der Legetätigkeit konnte ungefähr festgestellt werden, wann die Wirkung des Prolan zu erwarten stand und wann von einer weiteren Steigerung der Legeleistung lediglich auf Grund der Prolanbehandlung praktisch nicht mehr gesprochen werden konnte. In den ersten vier Tagen nach der Behandlung beginnt die Wirkung, erreicht in der Mitte der zweiten Woche ihren höchsten Stand und verläuft in der fünften Woche parallel der Kontrollkurve.

Zu diesen Versuchen wurde das Prolan der „I. G.-Farbenindustrie“ verwendet, das die *Behringwerke, Leverkusen* zur Verfügung stellten.

Das unter dem Handelsnamen „Prolan“ bekannte, nach Ratteneinheiten (RE) standardisierte übergeordnete Sexualhormon der *I. G.-Farbenindustrie* ist ein weiß-gelbes Pulver, das in Ampullen in Dosen zu 50 RE, 125 RE und 250 RE als Veterinärpackungen in den Handel kommt. In der Humanmedizin, die mit relativ höheren Dosen arbeitet, sind Packungen von 100 RE, 500 RE pro Ampulle und Dragées zu 150 RE gebräuchlich.

Chemisch ist Prolan ein proteinartiger Körper von wahrscheinlich enzymatischer Natur (*v. Euler* und *Zondek* (4)). Es ist leicht löslich in Wasser, verliert aber in gelöstem Zustand sehr schnell seine Wirkung. Daher dürfen Lösungen erst unmittelbar vor der Injektion hergestellt werden. Bei Erhitzen auf 60° C verliert es an Wirksamkeit, die es bei 100° C völlig einbüßt. In gelöstem Zustand zerfällt sich Prolan bei Einwirkung von Säuren oder Alkalien, Alkohol bringt es zur Fällung. Diese Reaktion des Prolan ist bei der Anwendung zu beachten. Injektionspritzen sind durch Auskochen keimfrei zu machen.

Die Gewinnung der Hormone, so auch des HVGH aus den Organen von Schlachttieren, ließ eine therapeutische Anwendung in der Tierheilkunde nicht zu, da sie mit großen Kosten verbunden war. Erst mit der Gewinnung des HVGH in Form des Prolan aus dem Harn schwangerer Frauen, aus dem es in beliebigen Mengen zu gewinnen ist, taten sich weitere Anwendungsmöglichkeiten auf, unter anderem seine

Verwendbarkeit in der Tierheilkunde. Immerhin stellt das Prolan noch ein kostspieliges Medikament dar, bei dessen Anwendung die Frage der Wirtschaftlichkeit sorgfältig zu berücksichtigen ist.

III. Die Versuche.

Versuch 1.

(Ausgeführt am 8. Februar 1937
in der staatlich anerkannten Vermehrungszucht G.-K. in S.)

In dem Betrieb befinden sich 400 weiße Leghorn-Zuchthennen (1935), mäßige bis gute Leger, die in letzter Zeit ohne erkenntlichen Grund wenig zufriedenstellende Legeleistungen zeigten.

Am 8. Februar werden aus diesem Bestand 87 Tiere wahllos herausgegriffen und behandelt. Jedes Tier erhält 25,0 RE Prolan in 0,5 ccm Aqu. dest. steril. gelöst in die Brustmuskulatur injiziert. Alle übrigen Tiere werden als Kontrollen belassen.

18 Tage nach der Behandlung werden aus den Legelisten die Leistungen der behandelten und nicht behandelten Tiere entnommen und mit einander verglichen.

I. Tiere, die vor der Behandlung mindestens eine Woche nicht gelegt hatten. Unter diesem Gesichtspunkt standen 18 Tiere mit 92 Kontrollen zu vergleichen. Für eine behandelte Henne konnte innerhalb der 18 Tage ein *Mehrertrag von 5 Eiern* errechnet werden.

II. Tiere, die vor der Behandlung mäßig gelegt hatten. Hier standen 62 behandelte Tiere 186 Kontrollen gegenüber. Für eine behandelte Henne konnte innerhalb der 18 Tage ein *Mehrertrag von 1 Ei* errechnet werden.

III. Tiere, die vor der Behandlung gut gelegt hatten. Hier standen 7 behandelte Hennen 31 Kontrollen gegenüber. Für eine behandelte Henne konnte innerhalb der 18 Tage ein *Minderertrag von 3 Eiern* errechnet werden.

Insgesamt wurde durch diese Behandlung von 87 Hennen in 18 Tagen eine Leistungssteigerung um 131 Eier gegenüber den Kontrollen erzielt.

Da kein besonderer Grund vorlag, wurden nur wenige Tiere zu einem Taftversuch mit 25 RE herangezogen. Im Ergebnis zeigt sich das bereits bekannte Bild der Abhängigkeit der Prolanwirkung von dem Entwicklungszustand des Eierstockes.

Die Ähnlichkeit in der Wirkung bei 25 RE mit der bei 12,5 RE (Koch (9)) war nun durch einen Versuch mit gleichzeitiger Anwendung beider Dosen genauer zu prüfen.

Versuch 2.

(Ausgeführt am 5. April 1937

in der staatlich anerkannten Vermehrungszucht G.-K. in S.)

Bestand 893 Tiere, 511 Junghennen, 361 Zuchthennen (1935) und 21 Hähne, weißer Leghorn. Die Legeleistung ist mit durchschnittlich 65—75 % gut. Die Fütterung ist einwandfrei. Eiweiß-, Mineralstoff- und Vitaminbedarf sind besonders berücksichtigt. Die Eier werden teils zum Verkauf, teils zur Brut verwandt.

Trotz gleichbleibender Kalkfütterung wird die Eischale im Februar und März in vielen Fällen derart schwach, daß diese Eier nicht mehr zur Brut verwendet werden können. Um diesen Uebelstand zu beheben, wird den Tieren *Chorkalzium* in kleinen Mengen im Futter beigegeben. Durch Unvorsichtigkeit eines Angestellten werden die Chlorkalziumgaben am 1. April derart gesteigert, daß am 2. und 3. April starke Vergiftungserscheinungen bei vielen Tieren auftreten. Starker Durst, Blaufärbung der Kehllappen und des Kammes sowie der Sektionsbefund bestätigen den Verdacht auf Chlorkalziumvergiftung. Die Legetätigkeit ist stark beeinträchtigt.

Am 4. April bessert sich der allgemeine Krankheitszustand und die Legetätigkeit steigt wieder an.

Im Einverständnis mit dem Besitzer wird am 5. April der ganze Bestand einer Prolanbehandlung unterzogen.

Die Tiere sind in 4 verschiedenen Stallungen untergebracht; die beiden ersten bergen die Junghennen, die beiden anderen die Zuchthennen und Hähne. Aus jedem Stall werden etwa 50 Hennen als Kontrolltiere nicht behandelt.

Da sich durch den ersten Versuch die Wirksamkeit höherer Prolandosen als 12,5 RE erwiesen hatte, sollte in diesem Versuch neben der Vergleichsbehandlung mit 12,5 RE und 25 RE auch bei einer kleineren Zahl von Hennen die verhältnismäßig hohe Dosis von 100 RE erprobt werden.

Es werden behandelt:

524 Tiere mit	12,5 RE
93 „ „	25,0 RE
20 „ „	100,0 RE

Insgesamt 637 werden behandelt und mit 235 Kontrollen verglichen.

Tabelle 1.

Uebersicht über die Behandlung in Versuch 2.

Art der Tiere		Prolan in RE resp. Kontrollen	Hennen, die infolge der Vergiftung nicht mehr gelegt hatten (I)	Hennen, die infolge der Vergiftung in der Legeleistung stark be- einträchtigt waren (II.)	Hennen, die infolge der Vergiftung nicht oder kaum beein- trächtigt waren (III)
A Jung- hennen	a	100 RE	5	15	—
		Kontrollen	37	84	—
	b	12,5 RE	88	211	49
		Kontrollen	wie A I a	wie A II a	22
B Zucht- hennen	a	25,0 RE	19	38	36
		Kontrollen	17	39	36
	b	12,5 RE	30	85	61
		Kontrollen	wie B I a	wie B II a	wie B III a

Bei diesem Großversuch haben sich die oben geschilderten Arbeitsweisen bewährt und die Durchführung der Operationen in 5 Stunden ermöglicht. In der Praxis dürfte die Behandlung noch schneller ablaufen, da auf eine genaue Protokollführung nicht Rücksicht genommen zu werden braucht und das Herausgreifen von Kontrolltieren nicht nötig ist.

A. Junghennen.

Zunächst wurden Tiere berücksichtigt, die vor dem 1. April nicht mehr gelegt, (vergl. Tabelle 1, A a I, A b I und Kontrollen; B a I, B b I und Kontrollen), früher aber normal gelegt hatten.

Der Wiederbeginn der Legetätigkeit und das Ansteigen der Leistungen bei den behandelten wie nicht behandelten Hennen kann aus *Tabelle 2* und *Abbildung 1* entnommen werden; demnach setzt das Legen bei den behandelten wie nicht behandelten Hennen etwa gleichmäßig in den ersten 4 Tagen nach der Behandlung wieder ein. Doch schon 10 Tage nach der Behandlung gehen die Legkurven deutlich auseinander. Von den behandelten Hennen haben inzwischen schon 80 % der Tiere zu legen begonnen (16. April), während bei den nicht behandelten Tieren noch nicht die Hälfte (43,2 %) gelegt hat. 13 Tage nach der Behandlung

Tabelle 2 (zu Versuch 2 A).

Wiederbeginn der Legetätigkeit nach Prolanbehandlung bei den Junghennen.

Legebeginn April 1937	Mit 100 RE behandelt 5 Hennen		Mit 12,5 RE behandelt 88 Hennen		Kontrollen 37 Hennen	
	Hennen	%	Hennen	%	Hennen	%
6.	—	—	14	15,90	1	2,7
7.	—	—	18	17,04	—	—
8.	—	—	23	23,87	3	8,1
9.	1	20	36	34,01	4	10,8
10.	—	—	40	37,40	—	—
11.	2	40	52	56,68	—	—
12.	3	60	58	62,40	10	27,0
13.	4	80	60	67,50	11	29,7
14.	—	—	72	79,42	15	37,8
15.	—	—	76	84,94	16	40,5
16.	—	—	79	86,07	17	43,2
17.	—	—	80	87,20	18	45,9
18.	5	100	—	—	19	48,6
19.	—	—	—	—	22	56,7
20.	—	—	—	—	—	—
21.	—	—	—	—	23	59,4
22.	—	—	83	89,46	—	—
23.	—	—	—	—	—	—
24.	—	—	88	100,00	24	62,1
25.	—	—	—	—	—	—
26.	—	—	—	—	—	—
27.	—	—	—	—	—	—
28.	—	—	—	—	25	64,8
29.	—	—	—	—	—	—
30.	—	—	—	—	26	67,5

hatten die mit 100 RE behandelten Hennen alle wieder gelegt, von den mit 12,5 RE behandelten Tieren legten schon 80 %, während die Kontrollhennen erst zur Hälfte (48,6 %) mit Legen begonnen hatten. 19 Tage nach der Behandlung haben auch alle mit 12,5 RE behandelten Hennen das Legen wieder aufgenommen, während erst 62,1 % der Kontrolltiere legten. Ende April, 25 Tage nach der Behandlung, legten erst $\frac{2}{3}$ (67,5 %) der Kontrolltiere.

B. Zuchthennen.


Das Wiedereinfsetzen der Legetätigkeit erfolgte bei den behandelten Zuchthennen (vergl. Tabelle 3 und Abbildung 2), die vor der Behandlung nicht mehr gelegt hatten, schneller als bei den Junghennen.

Die behandelten Zuchthennen nahmen am Tage nach der Behandlung das Legen wieder auf, während die zugehörigen Kontrollen erst am 3. Tage nach der Behandlung vereinzelt mit Legen begannen.

Abbildung 1 (zu Versuch 2 A).

Das Wiedereinsetzen der Legetätigkeit nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei 130 Junghennen.

Die Kurven geben die Zahl der legenden Hennen in Prozenten fämtlicher Hennen der Gruppe wieder.



5 Tage nach der Behandlung hatte $\frac{1}{3}$ (36,85 %) der mit 25 RE behandelten Tiere und mehr als die Hälfte (56,67 %) der mit 12,5 RE behandelten Hennen zu legen begonnen, während erst eine Kontrollhenne (5,88 %) legte.

9 Tage nach der Behandlung war das Wiedereinsetzen der Legetätigkeit zwischen behandelten und nicht behandelten Tieren schon mehr ausgeglichen. Von den mit 25 RE behandelten Hennen legten 78,98 %, bei den mit 12,5 RE behandelten Tieren 90 %, während die Kontrolltiere mit 58,82 % zurückblieben. Doch schon 2 Tage später, also 11 Tage nach der Behandlung, war das Wiedereinsetzen der Legetätigkeit bei den behandelten wie nicht behandelten Hennen mit 94 % gleich. Einen Tag später, 12 Tage nach der Behandlung, haben alle Kontrollhennen gelegt. Am 14. Tage nach der Behandlung legten auch alle mit 25 RE behandelten Hennen. Einen Tag später hatten auch alle mit 12,5 RE behandelten Hennen das Legen wieder begonnen.

In dem stärkeren Wiedereinsetzen der Legetätigkeit bei Junghennen zeigt sich wohl eine Prolanwirkung. Bei den Junghennen macht sich die Wirkung des Prolan wesentlich besser bemerkbar als bei den

Zuchthennen, da die Kontrolltiere bei den Junghennen anscheinend durch die Vergiftung erheblicher beeinträchtigt worden waren, als die Zuchthennen, die sich nach wenigen Tagen wieder erholt hatten.

Tabelle 3 (zu Versuch 2 B).

Wiederbeginn der Legetätigkeit nach Prolanbehandlung bei den Zuchthennen.

Legebeginn April 1937	Mit 25 RE behandelt 19 Hennen		Mit 12,5 RE behandelt 30 Hennen		Kontrollen 17 Hennen	
	Hennen	%	Hennen	%	Hennen	%
6.	2	10,53	5	16,66	—	—
7.	—	—	10	33,33	—	—
8.	3	15,79	12	40,00	1	5,83
9.	—	—	14	46,67	—	—
10.	7	36,85	17	56,67	—	—
11.	—	—	18	60,00	2	11,76
12.	8	42,12	22	73,33	—	—
13.	13	68,44	24	80,00	6	35,29
14.	15	78,98	27	90,00	10	58,82
15.	16	84,24	28	93,33	14	82,36
16.	18	94,96	—	—	16	94,10
17.	—	—	—	—	17	100,00
18.	—	—	—	—	—	—
19.	19	100,00	29	96,67	—	—
20.	—	—	30	100,00	—	—
21.	—	—	—	—	—	—
22.	—	—	—	—	—	—
23.	—	—	—	—	—	—
24.	—	—	—	—	—	—
25.	—	—	—	—	—	—
26.	—	—	—	—	—	—
27.	—	—	—	—	—	—
28.	—	—	—	—	—	—
29.	—	—	—	—	—	—
30.	19	100,00	30	100,00	17	100,00

Die Legeleistung.


Die Legetätigkeit zeigte in diesem Betrieb am Behandlungstage (5. April), also 4 Tage nach der Vergiftung etwa folgenden Stand:

- I. seit 4 Tagen legten nicht mehr 196 Hennen = 22,5 %
 II. seit 4 Tagen waren in der Legetätigkeit
 stark beeinträchtigt 472 „ = 54,1 %
 III. weiterhin gute Legeleistung zeigten 204 „ = 23,4 %

Ueber die Zahl und die Art der Behandlung sowie über die Kontrolltierausswahl gibt Tabelle 1 Aufschluß.

Abbildung 2 (zu Versuch 2 B).

Das Wiedereinfsetzen der Legetätigkeit nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei 66 Zuchthennen.



A. Junghennen.

I. Tiere, die infolge von Vergiftung das Legen eingestellt hatten.

a) Behandlung mit 100 RE:

5 behandelte Tiere stehen 37 Kontrolltieren gegenüber. Aus Tabelle 4 und Abbildung 3 ist die tägliche Legeleistung der behandelten wie nichtbehandelten Hennen zu entnehmen. Im Gegensatz zu der langsam und ziemlich gleichmäßig ansteigenden Leistung der Kontrolltiere zeigen die mit 100 RE behandelten Hennen ein etwas veripätetes, dafür aber plötzliches und oft stark unterbrochenes Ansteigen der Leistung. In der Gesamtheit sind die Leistungen der behandelten Hennen den Erträgen der nichtbehandelten Tiere weit überlegen. Es legte eine behandelte Henne in 25 Tagen nach der Behandlung durchschnittlich 13,2 Eier, während ein Kontrolltier in dieser Zeit 6,21 Eier legte.

Es legte somit eine behandelte Henne in 25 Tagen 7 Eier mehr als ein Kontrolltier.

b) Behandlung mit 12,5 RE:

Die unter A Ia betrachteten 37 Kontrollhennen werden 88 behandelten Hennen gegenübergestellt. Die Leistungen der behandelten

Tiere an 25 Tagen nach der Behandlung sind ebenfalls aus Tabelle 4 und Abbildung 3 zu entnehmen. Im Gegensatz zur Leistungskurve der mit 100 RE behandelten Hennen verläuft die Kurve der durch Behand-

Tabelle 4 (zu Versuch 2 A).

Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Junghennen.

I. Hennen, die infolge von Vergiftung nicht mehr gelegt hatten.

Dosierung April 1937	Mit 100 RE behandelt a		Mit 12,5 RE behandelt b		Kontrollen K	
	5 Hennen		88 Hennen		37 Hennen	
	Eier	%	Eier	%	Eier	%
6.	—	—	14	15,90	1	2,7
7.	—	—	1	1,13	—	—
8.	—	—	17	19,32	2	5,4
9.	1	20	16	18,19	2	5,4
10.	1	20	18	20,45	2	5,4
11.	1	20	40	45,45	1	2,7
12.	3	60	42	47,71	7	18,9
13.	2	40	44	49,97	5	13,5
14.	2	40	60	68,18	9	24,3
15.	4	80	61	69,31	11	29,7
16.	4	80	59	67,05	10	27,0
17.	4	80	69	78,41	11	29,7
18.	2	40	62	70,44	10	27,0
19.	3	60	63	71,57	16	43,2
20.	3	60	60	68,18	13	35,1
21.	4	80	63	71,57	10	27,0
22.	2	40	54	61,36	10	27,0
23.	5	100	62	70,44	10	27,0
24.	2	40	64	72,70	16	43,2
25.	4	80	58	66,02	13	35,1
26.	4	80	54	61,36	12	32,4
27.	2	40	63	71,57	13	35,1
28.	4	80	63	71,57	16	43,2
29.	4	80	50	56,81	12	32,4
30.	5	100	65	73,03	18	48,6

lung mit 12,5 RE Prolan erreichten Leistung, abgesehen von dem bedeutenderen Ansteigen, etwa gleichförmig mit der Kontrollkurve. Innerhalb von 10 Tagen nach der Behandlung haben die behandelten Hennen bereits eine gute Durchschnittsleistung erreicht (65—75 %), die sie, abgesehen von geringen Schwankungen beibehalten, während sich die Kontrollkurve in ähnlichem Verlauf um eine Durchschnittsleistung von 30 %


innerhalb der 25 Tage bewegt. Es ergibt sich für eine behandelte Henne innerhalb der 25 Tage eine Durchschnittsleistung von 13,78 Eiern, was gegenüber einer Kontrollhenne eine Mehrleistung von 7,57 Eiern innerhalb der 25 Tage ausmacht.

Abbildung 3 (zu Versuch 2 A).

Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Junghennen.

I. Hennen, die infolge der Vergiftung nicht mehr gelegt hatten.

Durch die Kurven ist die Legeleistung der einzelnen Gruppen in Prozenten dargestellt.



Somit wurde bei den 93 Junghennen, die durch Vergiftungsschädigung das Legen eingestellt hatten, nach Prolanbehandlung in 25 Tagen eine Legesteigerung um $35 + 666 = 701$ Eier erzielt.

II. Tiere, die infolge der Vergiftung in der Legetätigkeit stark beeinträchtigt waren.

Vor dem 1. April zeigten diese Tiere eine Legeleistung von durchschnittlich 70 %. In der Zeit vom 1. April bis zum Behandlungstage betrug die Legeleistung nur noch 48 %.

a) Behandlung mit 100 RE:

Es wurden aus dieser Gruppe 15 Hennen mit 100 RE behandelt. Auch hier verursachen die Leistungen nach der Behandlung wie bei A I a eine stark schwankende Kurve (Tabelle 5 und Abbildung 4). Nach raschem Anstieg, unterbrochen durch einen für alle Junghennen dieses

Verluches gemeinsamen Leistungsausfall am 2. Tage nach der Behandlung (7. April), erreichen die Leistungen am 9. Tage nach der Behandlung bereits 87 %, fallen dann aber wieder geringgradig und schwanken bis zum 25. Tage nach der Behandlung um 70 %, so daß sich für diese 25 Tage eine Durchschnittsleistung von 65 % errechnen läßt.

Die Legeleistung von 84 herangezogenen Kontrolltieren ist gegen die Leistung der mit 100 RE behandelten Hennen nur durch ein etwas langsameres, etwa bis zum 12. Tage nach der Behandlung dauerndes Ansteigen verschieden, was sich in einer durchschnittlichen Legeleistung von 56 % für 25 Tage nach der Behandlung auswirkt.

Tabelle 5 (zu Versuch 2 A).

Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Junghennen.


II. Hennen, die infolge der Vergiftung in der Legeleistung stark beeinträchtigt waren.

Dosierung April 1937	Mit 100 RE behandelt a		Mit 12,5 RE behandelt b		Kontrollen K	
	15 Hennen		211 Hennen		84 Hennen	
	Eier	%	Eier	%	Eier	%
6.	7	46,66	90	42,65	28	33,33
7.	—	—	—	—	—	—
8.	2	13,33	113	53,55	28	33,33
9.	9	60,00	125	59,24	42	50,00
10.	10	66,66	115	54,50	35	41,67
11.	6	40,00	147	69,66	42	50,00
12.	6	40,00	139	65,87	45	53,57
13.	9	60,00	143	67,77	44	52,38
14.	13	86,66	154	72,98	46	54,76
15.	13	86,66	165	78,19	54	64,29
16.	9	60,00	160	75,83	55	65,48
17.	11	73,33	153	72,51	57	67,85
18.	12	80,00	155	73,86	44	52,38
19.	10	66,66	148	70,14	60	71,43
20.	11	73,33	165	78,19	52	61,90
21.	11	73,33	158	74,88	53	63,10
22.	10	66,66	148	70,14	46	54,76
23.	14	93,33	148	70,14	54	64,29
24.	11	73,33	161	76,30	49	58,33
25.	10	66,66	139	65,87	55	65,48
26.	13	86,66	152	72,03	59	70,24
27.	10	66,66	146	69,19	46	54,76
28.	10	66,66	155	73,86	58	69,05
29.	13	86,66	173	81,99	56	66,66
30.	12	80,00	164	77,73	63	75,00

Abbildung 4 (zu Versuch 2 A).

Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Junghennen.

II. Hennen, die infolge der Vergiftung in der Legeleistung stark beeinträchtigt waren.



Dementsprechend sind die Leistungen einer Henne in den 25 Tagen nach der Behandlung nicht sehr unterschiedlich. Sie ergeben für eine behandelte Henne 16,13 Eier, für ein Kontrolltier 13,94 Eier, was für eine behandelte Henne innerhalb von 25 Tagen eine Mehrleistung von 2,19 Eiern ausmacht.

b) Behandlung mit 12,5 RE:

211 Hennen dieser Gruppe erhielten 12,5 RE Prolan und wurden mit den unter A II a geführten 84 Kontrolltieren verglichen. Auch hier ist das Verhältnis der Kurven einerseits nur durch ein stärkeres Ansteigen, andererseits durch einen ruhigeren Verlauf von den Leistungen der Kontrolltiere und von den Leistungen der mit 100 RE behandelten Tiere unterschieden. Die Durchschnittsleistung beläuft sich auf 68 %. Eine behandelte Henne legte in 25 Tagen nach der Behandlung 16,87 Eier. Es legte somit eine behandelte Henne in 25 Tagen nach der Behandlung 2,93 Eier mehr als ein Kontrolltier.

Es konnte bei den 226 Junghennen, die in ihrer Legeleistung stark beeinträchtigt waren, durch Prolanbehandlung ein Mehrertrag von 650 Eiern erzielt werden.

III. Tiere, die infolge der Vergiftung nicht beeinträchtigt waren.

Vor dem 1. April betrug die Legeleistung dieser Tiere etwa 80 %. In dieser Zeit waren bedeutende Schwankungen der Legetätigkeit festzustellen. In der Zeit vom 1. April bis zum Behandlungstage fiel die Leistung auf 79 %.

Von den Hennen dieser Gruppe wurde keine mit 100 RE behandelt.

49 Tiere waren mit 12,5 RE behandelt worden. In den 25 Tagen nach der Behandlung fiel ihre Leistung auf durchschnittlich 71 %. Zum Vergleich konnten 22 nichtbehandelte Hennen herangezogen werden, deren Legetätigkeit sich in den 25 Tagen auf 71 % senkte. Tabelle 6

Tabelle 6 (zu Versuch 2 A).

Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Junghennen.

III. Hennen, die infolge der Vergiftung nicht beeinträchtigt waren.

Dosierung April 1937	Mit 12,5 RE behandelt b		Kontrollen K	
	49 Hennen		22 Hennen	
	Eier	%	Eier	%
6.	35	71,43	17	77,27
7.	1	2,04	—	—
8.	37	76,23	18	81,82
9.	39	81,03	14	63,64
10.	28	57,14	14	63,64
11.	38	78,63	16	72,73
12.	36	73,46	18	81,82
13.	42	85,71	15	68,18
14.	40	81,63	18	81,82
15.	43	88,11	17	77,27
16.	39	81,03	19	86,36
17.	37	76,23	18	81,82
18.	37	76,23	17	77,27
19.	38	78,63	15	68,18
20.	40	81,63	14	63,64
21.	38	78,63	16	72,73
22.	34	69,39	17	77,27
23.	36	73,46	12	54,55
24.	28	57,14	17	77,27
25.	36	73,46	16	72,73
26.	40	81,63	15	68,18
27.	33	67,35	17	77,27
28.	31	63,27	14	63,64
29.	35	71,43	18	81,82
30.	29	59,18	17	77,27


und Abbildung 5 zeigen deutlich dieses gleichmäßige Verhalten der behandelten wie nichtbehandelten Tiere. Die gute Legeleistung von 79 % vor der Behandlung ist in den 25 Tagen nach der Behandlung für behandelte wie nichtbehandelte Hennen weiterhin gleichmäßig gut.

Der Vergleich mit den zugehörigen Kontrollen zeigt, daß die Behandlung mit 12,5 RE bei Hennen, die gut legen, völlig wirkungslos

Abbildung 5 (zu Versuch 2 A).

Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Junghennen.

III. Hennen, die infolge der Vergiftung nicht beeinträchtigt waren.



verlaufen ist. Es hat eine behandelte Henne innerhalb der 25 Tage durchschnittlich 0,1 Ei weniger gelegt als eine Kontrollhenne.

Der Leistungsabstieg bei den behandelten wie nichtbehandelten Junghennen innerhalb der 25 Untersuchungstage ist durch das Fehlen der Ergebnisse am 7. April zu erklären. An diesem Tage sind die Leistungen der Junghennen bei Entnahme der Eier aus den Fallennestern versehentlich nicht in den Legelisten vermerkt worden.

B. Zuchthennen.

Bei den Zuchthennen wurden Behandlungen mit 25 RE und 12,5 RE Prolan durchgeführt (siehe Tabelle 1). Die Betrachtung der Ergebnisse entspricht der Durchführung bei den Junghennen.

I. Tiere, die infolge der Vergiftung das Legen eingestellt hatten.

a) Behandlung mit 25 RE:

19 behandelte Hennen stehen 17 Kontrolltieren gegenüber. Ihre Leistungen nach der Behandlung sind aus Tabelle 7 und Abbildung 6

zu entnehmen. Wie aus Tabelle 3 und Abbildung 2 zu ersehen ist, beginnen die behandelten Hennen gleich am ersten Tage nach der Behandlung zu legen und steigern bis zum 15. Tage nach der Behandlung in absolut normalen Schwankungen ihre Legeleistung auf etwa 85 %.

Tabelle 7 (zu Versuch 2 B).

Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Zuchthennen.

I. Hennen, die infolge der Vergiftung nicht mehr gelegt hatten.

Dosierung April 1937	Mit 25 RE behandelt a		Mit 12,5 RE behandelt b		Kontrollen K	
	19 Hennen		30 Hennen		17 Hennen	
	Eier	%	Eier	%	Eier	%
6.	2	10,53	5	16,66	—	—
7.	1	5,26	7	23,33	—	—
8.	2	10,53	7	23,33	1	5,88
9.	2	10,53	12	40,00	—	—
10.	6	31,59	12	40,00	—	—
11.	4	21,06	9	30,00	1	5,88
12.	7	36,85	18	60,00	2	11,76
13.	7	36,85	20	66,66	5	29,41
14.	11	57,91	18	60,00	8	47,05
15.	11	57,91	18	60,00	11	64,70
16.	13	68,44	24	80,00	10	58,82
17.	12	63,18	23	76,67	10	58,82
18.	14	73,71	21	70,00	12	70,58
19.	16	84,24	15	50,00	12	70,58
20.	16	84,24	23	76,67	7	41,18
21.	15	78,98	23	76,67	14	82,36
22.	13	68,44	21	70,00	10	58,82
23.	13	68,44	21	70,00	13	76,46
24.	13	68,44	22	73,33	12	70,58
25.	13	68,44	20	66,66	13	76,46
26.	13	68,44	19	63,33	7	41,18
27.	14	73,70	19	63,33	14	82,36
28.	17	89,48	22	73,33	13	76,46
29.	13	68,44	24	80,00	8	47,06
30.	15	78,98	20	66,66	14	82,36


Bei den Kontrollhennen setzt die Legetätigkeit erst 3 Tage nach dem Behandlungstage ein, setzt am 4. und 5. Tage aber wieder aus. Am 6. Tage beginnt ein starker Anstieg, der mit wenigen aber starken Schwankungen am 15. Tage die Legeleistung auf etwa 83 % ansteigen läßt. In den nächsten 6 Tagen schwankt die Legeleistung der Kontrolltiere um 62 %, während in der gleichen Zeit die Leistung der behandelten

Hennen sich um 70 % bewegt. Am 23. Tage nach der Behandlung zeigen die behandelten Tiere mit 89,48 % ihre Höchstleistung, die bis zum 25. Tage nach der Behandlung bis auf 68 % sinkt. Die Legeleistung der Kontrolltiere verläuft in den letzten 4 Tagen des Monats in starken täglichen Schwankungen zwischen 50 % und 80 %. Der frühere Legebeginn und die durchschnittlich geringgradig bessere Legeleistung brachte für eine behandelte Henne in 25 Tagen nach der Behandlung eine Lege-

Abbildung 6 (zu Versuch 2 B).

Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Zuchthennen.

I. Hennen, die infolge der Vergiftung nicht mehr gelegt hatten.



leistung von 13,85 Eiern, während eine Kontrollhenne in dieser Zeit nur 11,59 Eier legte.

Es legte also eine behandelte Henne in 25 Tagen 2,26 Eier mehr als ein Kontrolltier.

b) Behandlung mit 12,5 RE:

Mit den Kontrollhennen aus B I a sind 30 behandelte Hennen zu vergleichen, deren Legeleistung in 25 Tagen nach der Behandlung aus Tabelle 7 und Abbildung 6, der Beginn der Legetätigkeit aus Tabelle 3 und Abbildung 2 zu entnehmen ist.

Die Tiere beginnen am Tage nach der Behandlung zu legen und steigern ihre Legeleistung bis zum 11. Tage nach der Behandlung auf 80 %. Es folgt eine zwischenzeitliche Leistung von durchschnittlich 70 %, die

lediglich am 24. Tage nach der Behandlung durch eine 80 %ige Legeleistung unterbrochen wird.

Gegenüber den mit 25 RE behandelten Hennen und den Kontrollhennen ist die Legeleistung dieser Hennen in der ersten Monatshälfte schon vom ersten Tage nach der Behandlung an besser, während in der zweiten Hälfte des Monats die Kurven der 3 Vergleichsgruppen wenig unterschiedlich verlaufen.

Es legte eine Henne in den 25 Tagen 14,77 Eier, also in dieser Zeit 3,18 Eier mehr als ein Kontrolltier.

Die 49 Zuchthennen, die infolge der Vergiftung das Legen eingestellt hatten, zeigten nach Prolanbehandlung in 25 Tagen eine Leistungssteigerung um 138 Eier.

II. Hennen, die infolge der Vergiftung in der Legeleistung stark beeinträchtigt waren.

Vor dem 1. April zeigten diese Tiere eine Legeleistung von durchschnittlich 68 % (zu vergleichen Tabelle 8 und Abbildung 7).

a) Behandlung mit 25 RE:

Aus dieser Gruppe wurden 38 Tiere mit 25 RE behandelt. Ihre Legeleistung vom 1. bis 4. April war auf 44 % gesunken. In den ersten 4 Tagen nach der Behandlung sank die Legeleistung auf 34 %, stieg dann aber an und erreichte am 11. Tage nach der Behandlung 81 %. Diese Leistungshöhe haben die Hennen bis zum Monatsende nicht wieder erreicht. In dieser Zeit schwankten die Leistungen um 68 %, so daß sich eine Gesamtleistung von 59 % innerhalb der 25 Tage nach der Behandlung errechnen läßt.

Zur Kontrolle dienten 39 Tiere, deren Legetätigkeit in den 4 Tagen vor der Behandlung 40 % betrug, in 3 Tagen nach der Behandlung weiterhin auf 25 % sank, dann aber bis zur Mitte des Monats etwa auf 70 % stieg, bis zum Ende des Monats aber wieder auf durchschnittlich 65 % ab sank. Es ergab sich für die 25 Tage eine Durchschnittsleistung von 59 %.

Entsprechend diesem Ansteigen der Legetätigkeit nach der Behandlung unter Berücksichtigung der Leistungsdifferenz vor der Behandlung legte eine behandelte Henne in 25 Tagen nach der Behandlung 14,68 Eier, eine Kontrollhenne in gleicher Zeit 14,98 Eier.

b) Behandlung mit 12,5 RE:

85 behandelte Hennen sind mit den unter B II a geführten Kontrollen zu vergleichen. Ihre Legeleistung betrug in den letzten 4 Tagen

vor der Behandlung 48 %, stieg aber gleich nach der Behandlung im ersten Drittel des Monats wieder auf 70 % und behielt, abgesehen von größeren Schwankungen, diesen Stand bis zum Monatsende bei. Die Gesamtleistung dieser Tiere bis zum 25. Tage nach der Behandlung beträgt 67 %.

Eine behandelte Henne legte in den 25 Tagen 17,78 Eier, was im Verhältnis zur Leistung eines Kontrolltieres bei Berücksichtigung der Leistungsunterschiede dieser beiden Gruppen vor der Behandlung für eine mit 12,5 RE behandelte Henne in 25 Tagen einen Mehrertrag von 2,8 Eiern ausmacht.

Tabelle 8 (zu Versuch 2 B).


Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Zuchthennen.

II. Hennen, die infolge der Vergiftung in der Legeleistung stark beeinträchtigt waren.

Dofierung April 1937	Mit 25 RE behandelt a		Mit 12,5 RE behandelt b		Kontrollen K	
	38 Hennen		85 Hennen		39 Hennen	
	Eier	%	Eier	%	Eier	%
6.	14	36,84	36	42,35	10	25,64
7	12	31,58	42	49,41	9	23,08
8.	14	36,84	42	49,41	13	33,33
9.	13	34,21	48	56,47	15	38,46
10.	20	52,63	52	61,18	18	46,16
11.	16	42,11	59	69,41	17	43,59
12.	24	63,16	57	67,05	17	43,59
13.	21	55,26	57	67,05	25	64,10
14.	24	63,16	65	76,47	24	61,54
15.	24	63,16	60	70,58	26	66,67
16.	31	81,58	64	75,29	28	71,79
17.	22	57,89	58	68,24	27	69,24
18.	27	71,05	60	70,52	26	66,67
19.	25	65,79	55	64,76	28	71,79
20.	24	63,16	64	75,29	27	69,24
21.	20	52,63	57	67,05	27	69,24
22.	30	78,95	64	75,29	26	66,67
23.	27	71,05	58	68,24	22	56,41
24.	22	57,89	64	75,29	28	71,79
25.	22	57,89	66	77,64	25	64,10
26.	18	47,37	55	64,76	24	61,54
27.	27	71,05	57	67,05	22	56,41
28.	25	65,79	60	70,52	28	71,79
29.	21	55,26	67	78,82	23	58,97
30.	31	81,58	59	69,41	27	69,24

Abbildung 7 (zu Versuch 2 B).

Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Zuchthennen.



In dieser Gruppe war also durch Behandlung mit 12,5 RE allein ein Erfolg zu erzielen, der für die mit dieser Dosis behandelten 85 Hennen in 25 Tagen einen Mehrertrag von 238 Eiern ausmacht.

III. Tiere, die infolge der Vergiftung nicht beeinträchtigt waren.

Vor dem 1. April betrug bei diesen Tieren die Legeleistung 70 %. In der Zeit vom 1. bis 4. April war sie für die einzelnen Behandlungsgruppen verschieden.

Die tägliche Legeleistung vom 6. bis 30. April zeigt Tabelle 9 und Abbildung 8.

a) Behandlung mit 25 RE:

36 behandelte Hennen sind mit 36 Kontrolltieren zu vergleichen. Für behandelte wie nichtbehandelte Hennen betrug die Legeleistung 4 Tage vor der Behandlung 66 %. Nach dem Behandlungstage verlaufen die Leistungskurven ohne besondere Unterschiede gleichmäßig bis zum Ende des Monats. Die Durchschnittsleistung betrug in diesen 25 Tagen für die behandelten Tiere 68 %, für die Kontrollhennen 70 %.

Es legte eine behandelte Henne in diesen 25 Tagen 17,11 Eier, eine Kontrollhenne 17,61 Eier.

Tabelle 9 (zu Versuch 2 B).

Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Zuchthennen.

III. Hennen, die infolge der Vergiftung nicht beeinträchtigt waren.

Dosierung April 1937	Mit 25 RE behandelt a 36 Hennen		Mit 12,5 RE behandelt b 61 Hennen		Kontrollen K 36 Hennen	
	Eier	%	Eier	%	Eier	%
6.	23	63,89	35	57,37	19	52,78
7.	25	69,44	40	65,57	29	80,56
8.	24	66,66	49	80,32	28	77,78
9.	21	58,33	47	77,05	28	77,78
10.	27	75,00	36	59,01	25	69,44
11.	26	72,22	43	70,49	28	77,78
12.	24	66,66	43	70,49	23	63,89
13.	27	75,00	51	83,60	29	80,56
14.	22	61,11	48	78,70	29	80,56
15.	25	69,44	45	73,78	30	83,33
16.	22	61,11	52	85,25	26	72,22
17.	31	86,11	38	62,30	20	55,56
18.	25	69,44	47	77,05	28	77,78
19.	26	72,22	43	70,49	29	80,56
20.	24	66,66	41	67,21	23	63,89
21.	26	72,22	45	73,78	23	63,89
22.	24	66,66	43	70,49	25	69,44
23.	28	77,77	43	70,49	27	75,56
24.	17	47,22	49	80,32	26	72,22
25.	26	72,22	39	63,93	23	63,89
26.	22	61,11	47	77,05	22	61,11
27.	20	55,56	41	67,21	30	83,33
28.	26	72,22	37	63,93	17	47,22
29.	28	77,77	44	72,13	29	80,56
30.	27	75,00	49	80,32	25	69,44

b) Behandlung mit 12,5 RE:


61 behandelte Tiere stehen den unter B III a genannten Kontrollhennen gegenüber. Die Durchschnittslegetätigkeit dieser Hennen betrug in den 4 Tagen vor der Behandlung 73 %, fiel aber in den 25 Tagen nach der Behandlung auf 72 %. Im wesentlichen verläuft die Leistungskurve dieser Hennen wie die unter B III a besprochenen Kurven.

Eine mit 12,5 RE behandelte Henne legte in 25 Tagen bei Berücksichtigung ihrer Leistungen vor dem Behandlungstage 16,1 Eier, also 1,5 Eier weniger als ein Kontrolltier.

Abbildung 8 (zu Versuch 2 B).

Die Legeleistung nach Prolanbehandlung am 5. April 1937 bei Zuchthennen.

III. Hennen, die infolge der Vergiftung nicht beeinträchtigt waren.



Die Legetätigkeit normal legender Hennen konnte weder durch 25 RE noch durch 12,5 RE Prolan gesteigert werden. Es zeigten vielmehr die Kontrollen eine bessere Leistung als die behandelten Tiere.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus Versuch 2.

Erfolg mit 100 RE Prolan:

Bei Junghennen.

A Ia: Tiere, die nicht mehr gelegt hatten, werden mit 100 RE behandelt. In einer Beobachtungszeit von 25 Tagen legt eine behandelte Henne *7 Eier mehr* als eine nichtbehandelte Henne.

A IIa: Tiere, die in der Legeleistung stark beeinträchtigt waren, werden nach gleicher Behandlung ebenfalls 25 Tage beobachtet. Hier legt eine behandelte Henne in dieser Zeit *2,19 Eier mehr* als eine nichtbehandelte Henne.

Erfolg mit 12,5 RE Prolan:

Bei Junghennen.

A Ib: Unter gleichen Umständen wie bei A Ia, jedoch bei einer Behandlung mit 12,5 RE legt eine behandelte Henne *7,57 Eier mehr* als eine nichtbehandelte Henne.

A IIb: Unter gleichen Umständen wie bei A IIa, jedoch bei einer Behandlung mit 12,5 RE legt eine behandelte Henne *2,93 Eier mehr* als eine nichtbehandelte Henne.

A IIIb: Tiere, die in ihrer Legetätigkeit nicht beeinträchtigt waren, werden mit 12,5 RE behandelt und 25 Tage beobachtet. Es legt eine behandelte Henne *0,1 Ei weniger* als eine nichtbehandelte Henne.

Bei Zuchthennen.

- B I b: Tiere wie A I b im Zuchthennenstall. Es legt eine behandelte Henne 3,18 Eier mehr als eine nichtbehandelte Henne.
- B II b: Tiere wie A II b im Zuchthennenstall. Es legt eine behandelte Henne 2,8 Eier mehr als eine nichtbehandelte Henne.
- B III b: Tiere wie A III b im Zuchthennenstall. Es legt eine behandelte Henne 1,5 Eier weniger als eine nichtbehandelte Henne.

Erfolg mit 25 RE Prolan:

Bei Zuchthennen.

- B I a: Tiere wie A I b, jedoch bei einer Behandlung mit 25 RE. Es legt eine behandelte Henne 2,26 Eier mehr als eine nichtbehandelte Henne.
- B II a: Tiere wie A II b, mit 25 RE behandelt. Es legt eine behandelte Henne wie eine Kontrollhenne, also kein Erfolg!
- B III a: Tiere wie A III b, mit 25 RE behandelt. Es legt eine behandelte Henne 0,5 Eier weniger.

Die einzelnen Ergebnisse dieses Versuches sind in Tabelle 10 noch einmal vergleichend zusammengestellt.

Tabelle 10 (zu Versuch 2).

Der Mehr- (+) oder Minderertrag (—) an Eiern bei einer mit Prolan behandelten Henne in 25 Tagen.

Prolandosen:		(a) 100 RE	(b) 12,5 RE	(a) 25 RE
I. Henne, die nicht mehr gelegt hat	(A) Junghenne	+ 7	+ 7,57	—
	(B) Zuchthenne	—	+ 3,18	+ 2,26
II. Henne, die stark beeinträchtigt war	(A) Junghenne	+ 2,19	+ 2,93	—
	(B) Zuchthenne	—	+ 2,8	0
III. Henne, die normal weiterlegte	(A) Junghenne	—	— 0,1	—
	(B) Zuchthenne	—	— 1,5	— 0,5

Uebersicht über Dosierung und Indikation.

Die wirksamste Behandlungsform ist nach den Ergebnissen dieses Versuches die Prolandosis 12,5 RE pro Henne. Ueberall da, wo eine

Prolanbehandlung in diesem Versuche anregend auf die Legetätigkeit der Henne wirkte, zeigte diese Dosierung die besten Ergebnisse.

Mit 12,5 RE Prolan wurden insgesamt 524 Tiere behandelt und diese mit 248 Kontrolltieren verglichen. Bei diesem Umfang dürfte das Ergebnis eindeutig sein.

Die Prolandosis von 100 RE wurde nur bei insgesamt 20 Hennen versucht. Sie zeitigte geringeren Erfolg wie 12,5 RE. Zu Schädwirkungen kam es trotz der hohen Dosis nicht. Da eine Behandlung mit 100 RE pro Henne sich sehr teuer gestaltet, dürften weitere Versuche mit 100 RE in diesem Rahmen unzweckmäßig sein.

Mit 25 RE Prolan wurden nur Zuchthennen behandelt. 93 behandelte Tiere standen 92 Kontrolltieren gegenüber. Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit dieser Dosis dürfte das negative Ergebnis bei stark im Legen beeinträchtigten Hennen ausschlaggebend sein. Verglichen mit dem Erfolg bei einer Gabe von 12,5 RE ist die Wirkung bei 25 RE sehr viel schwächer, was auch diese Dosierung, zumal sie kostspieliger ist, hinter 12,5 RE zurücktreten läßt.

Die besten Erfolge zeigten in diesem Versuch die Hennen, die vor der Prolanbehandlung nicht mehr gelegt hatten.

Der Erfolg bei den Tieren, die in ihrer Legetätigkeit stark beeinträchtigt waren, ist wahrscheinlich von der richtigen Dosierung abhängig, die mit 12,5 RE in vorliegendem Falle richtig getroffen wurde.

Tiere, die in ihrer Legeleistung nicht beeinflusst waren (normal legende Hennen) sind nach obiger Tabelle 10 durch Prolan allenfalls negativ zu beeinflussen. Wie solche negativen Ergebnisse herbeigeführt sein können, wurde schon in der Einleitung erwähnt. Genauere Untersuchungen in dieser Richtung konnten hier nicht durchgeführt werden, da der starke Abfall der Legeleistung nach der Behandlung durch den hohen Leistungsstand vor der Behandlung und durch das Fehlen der Leistungsangaben im Junghennenstall am 7. April wohl teilweise zu erklären ist.

Die Steigerung der Legetätigkeit durch früheres Wiedereinfsetzen und fleißigeres Legen brachte bei 637 behandelten Hennen in 25 Tagen einen absoluten Mehrertrag von insgesamt 1727 Eiern.

Dieses Ergebnis, das für eine behandelte Henne in 25 Tagen eine Mehrleistung von 2,65 Eiern ausmacht, dürfte bei einem ähnlich schädigenden Vorkommen in einem größeren Bestand unbedingt wirtschaftlich sein. Bei allgemeiner Behandlung aller im Legen nachlassenden Hennen mit 12,5 RE Prolan würde die Leistung einer behandelten Henne noch erheblicher zu steigern sein.

Versuch 3.

(Ausgeführt am 27. August
in der staatlich anerkannten Geflügelzucht E. in F.)

Es sollte untersucht werden, ob das Nachlassen der Legetätigkeit, das normalerweise in den Sommermonaten beginnt, durch Prolanbehandlung aufgehalten werden kann. Es wurde zu diesem Zwecke ein Bestand gewählt, in dem mit einem baldigen Nachlassen der noch guten Legeleistungen zu rechnen war.

Aus einem Stall, der 300 einjährige weiße Leghornhennen barg, wurden 100 Tiere herausgegriffen und davon 50 Hennen mit 12,5 RE Prolan, die übrigen 50 mit 25 RE Prolan behandelt.

Da der Bestand im September eine Sortierung erfahren sollte, wurden nur solche Tiere behandelt, die im September nicht ausschieden, also in der Hauptsache die guten Leger.

Nach Ablauf von 30 Tagen nach der Behandlung ergab die Durcharbeitung der Legelisten, daß sich in diesem Bestande nur gute und mittelmäßige Leger befanden.

I. Hennen, die vor der Behandlung mäßig gelegt hatten.

a) Behandlung mit 25 RE:

19 behandelte Hennen sind mit 24 Kontrolltieren zu vergleichen. Vor dem Behandlungstage zeigten behandelte wie nichtbehandelte Hennen eine tägliche Legeleistung von 50 %. Die Legeleistung der behandelten Hennen steigerte sich in den 30 Tagen nach der Behandlung auf 57 %, während die Kontrolltiere in dieser Zeit weiterhin eine 50 %ige Legeleistung zeigten.

Die durchschnittliche Legeleistung einer behandelten Henne in den 30 Tagen nach der Behandlung waren 17,21 Eier; ein Kontrolltier legte in dieser Zeit nur 15,13 Eier.

Es legte also eine behandelte Henne in 30 Tagen nach der Behandlung 2,08 Eier mehr als eine Kontrollhenne.

b) Behandlung mit 12,5 RE:

10 behandelte Hennen stehen den oben genannten Kontrolltieren (24) gegenüber. Die behandelten Hennen zeigen vor der Behandlung eine durchschnittliche Legeleistung von 51 %, die in den ersten 15 Tagen nach der Behandlung auf 60 % steigt, in den folgenden 15 Tagen aber wieder auf 51 % absinkt, so daß sich für die 30 Tage nach der Behandlung eine Durchschnittsleistung von etwa 55 % errechnen läßt.

Es legte eine behandelte Henne in den 30 Tagen nach der Behandlung durchschnittlich 16,66 Eier, also *1,47 Eier mehr* als eine Kontrollhenne.

Es wurde also bei 29 Hennen, die vor der Behandlung mäßig gelegt hatten, durch Prolanbehandlung in 30 Tagen eine Leistungssteigerung von 54,26 Eiern erzielt.

II. Hennen, die vor der Behandlung eine gute Legeleistung zeigten.

a) Behandlung mit 25 RE:

23 behandelte Hennen sind mit 27 Kontrolltieren zu vergleichen. Vor der Behandlung betrug die Legeleistung für beide Gruppen 70 %. In den 30 Tagen nach der Behandlung fiel die Legeleistung der behandelten Hennen auf 65 %, während sie bei den Kontrolltieren auf 60 % absank.

Es legte eine behandelte Henne in den 30 Tagen nach der Behandlung durchschnittlich 19,65 Eier; eine Kontrollhenne legte in dieser Zeit durchschnittlich 17,77 Eier.

Es legte also eine behandelte Henne in 30 Tagen nach der Behandlung *1,88 Eier mehr* als eine Kontrollhenne.

b) Behandlung mit 12,5 RE:

27 behandelte Hennen sind mit den oben genannten 27 Kontrolltieren zu vergleichen. Auch hier betrug die Legeleistung der Hennen vor der Behandlung 70 %. In den 30 Tagen nach der Behandlung sank sie auf 56 %.

Eine behandelte Henne legte in den 30 Tagen nach der Behandlung 16,66 Eier, also *1,11 Eier weniger* als eine Kontrollhenne.

Insgesamt haben die 50 Hennen, die vor der Behandlung gute Legeleistungen zeigten, nach Prolanbehandlung in 30 Tagen eine Leistungssteigerung um etwa 13 Eier erfahren.

Ergebnis dieses Versuches.

Die Legetätigkeit der Hennen vor dem Behandlungstage war vollauf befriedigend. Eine Voraussetzung für eine Behandlung zur Aufhaltung des Nachlassens der Legetätigkeit war nicht gegeben, da der Bestand noch weiterhin gut legte, wie das aus dem Verhalten der Kontrollen nach dem Behandlungstage zu ersehen ist. In dieser Hinsicht kann der Versuch also nicht gewertet werden.

Als „Prolanbehandlung bei normal legenden Hennen“ zeigt die Unterfuchung ein Ergebnis, das schon frühere Versuche boten.

Eine gütliche Beeinflussung der Legetätigkeit normal legenden Hennen kann durch Prolaninjektionen von 12,5 RE pro Henne nicht erzielt werden. Bei einer Gabe von 25 RE scheint ein geringfügiger Erfolg vorhanden zu sein (vergl. Versuch 2/B III a).

Das Ergebnis läßt vermuten, daß Prolan auf den leistungsfähigen Eierstock störend wirkt.

Versuch 4.

(Ausgeführt am 29. Oktober 1937
in der staatlich anerkannten Vermehrungszucht G.-K. in S.)

Unter den 188 Junghennen (1937) dieses Bestandes war die Legeleistung schon seit längerer Zeit sehr schlecht. Viele Hennen hatten trotz längst eingetretener Reife noch nicht mit Legen begonnen, andere nach kurzer Legeperiode wieder aufgehört. Stallhaltung und Vielseitigkeit in der Fütterung ließen nichts zu wünschen übrig.

Ein großer Teil der Hennen ging in die Halsmauser, was auf eine psychische Störung der Hennen hindeutete, deren Grund aber nicht festgestellt werden konnte. Vereinzelt konnte bei Hennen auch Schnupfen festgestellt werden. Vermuteter Wurmbefall konnte durch die Sektion nicht nachgewiesen werden.

Von diesen 188 Hennen wurden am 29. Oktober abends 81 Hennen mit 5 RE, 58 Hennen mit 12,5 RE Prolan behandelt und 49 Hennen zur Kontrolle nicht behandelt. Die Behandlungsweise entsprach der Methode bei den anderen Versuchen.

Nach Ablauf von 27 Tagen nach der Behandlung wurden die Ergebnisse an Hand der Legelisten überprüft, da am 28. November ein neuer Versuch (f. u.) durchgeführt werden sollte. Die Legeergebnisse zeigten, daß von den 188 Tieren 148 Hennen 9 Tage vor der Behandlung nicht gelegt hatten und 40 Hennen nur mittelmäßige Leistungen zeigten.

I. Hennen, die 9 Tage vor der Behandlung nicht gelegt hatten.

Von diesen Hennen wurden 70 mit 5 RE behandelt. Eine Henne dieser Gruppe legte in den nächsten 27 Tagen 5,21 Eier.

40 Hennen wurden mit 12,5 RE behandelt. Eine Henne dieser Gruppe legte in den nächsten 27 Tagen 4,98 Eier.

Zur Kontrolle dienten 38 Hennen; von diesen legte eine Henne in den nächsten 27 Tagen 4,93 Eier.

Praktisch wurde in jeder dieser 3 Gruppen eine gleiche Anzahl Eier gelegt. Von einem Erfolg durch Prolanbehandlung kann hier nicht gesprochen werden.

II. Hennen, die 9 Tage vor der Behandlung mittelmäßig gelegt hatten.

a) Behandlung mit 5 RE:

11 behandelte Tiere sind mit 11 Kontrolltieren zu vergleichen. Vor dem Behandlungstage zeigte eine behandelte Henne eine durchschnittliche Legeleistung von 53 %, die nach der Behandlung auf 46 % sank. Bei den Kontrollhennen stieg die Legeleistung von 49 % vor der Behandlung in den 27 Tagen nach der Behandlung auf 58 %.

Es legte eine behandelte Henne in den 27 Tagen nach der Behandlung 12,42 Eier, während eine Kontrollhenne in dieser Zeit 15,66 Eier legte.

Es legte also eine behandelte Henne in 27 Tagen nach der Behandlung 3,24 Eier weniger als eine Kontrollhenne.

b) Behandlung mit 12,5 RE:

18 behandelte Hennen stehen den oben geführten 11 Kontrollhennen gegenüber. Vor dem Behandlungstage zeigten die behandelten Hennen eine Legeleistung von 57 %, die nach der Behandlung auf 58 % anstieg.

Eine behandelte Henne legte in den 27 Tagen nach der Behandlung 15,66 Eier, also die gleiche Anzahl Eier, die in diesen Tagen eine Kontrollhenne legte.

Soweit diese Unterschiede nicht durch eine ungleiche Verteilung von kranken Tieren auf die Untersuchungsgruppen herbeigeführt wurden, könnte man aus den verschiedenen Ergebnissen in den 3 Gruppen folgendes schließen:

Die Leistungssteigerung bei den Kontrollhennen soll als normal gelten, bedingt durch Wiedereintritt normaler Leistungsfähigkeit bei einzelnen Hennen. Die behandelten Tiere wurden durch die Behandlung störend beeinflusst. Die Prolangabe von 12,5 RE wirkte gerade dahin, die störende Wirkung durch hormonale Anregung auszugleichen. Die Prolangabe von 5 RE war zu schwach, um einen Ausgleich herbeizuführen; diese Behandlung verlief wirkungslos und zeigt so den störenden Einfluß, mit dem bei einer Behandlung gerechnet werden muß.

Versuch 5.

(Ausgeführt am 26. November 1937
in der staatlich anerkannten Vermehrungszucht G.-K. in S.)

Dieser Versuch umfaßt den gleichen Junghennenstall, der bereits am 29. Oktober 1937 einer Prolanbehandlung unterzogen und in Versuch 4 beschrieben worden war. Bei dieser ersten Behandlung konnte keine Ursache für den schlechten Leistungsstand der Hennen ermittelt werden. Nur einzelne Tiere zeigten Schnupfen, doch konnten diese Ausnahmen nicht für den allgemein schlechten Leistungsstand verantwortlich gemacht werden. Ich möchte die schlechten Legeergebnisse durch eine bereits abgeklungene psychische Störung erklären, die bei vielen Hennen zu Rückbildung entwickelter Follikel und so zu Unterbrechung der Legetätigkeit geführt hatte, die äußerlich mit Halsmauer einherging. Es war demnach zu vermuten, daß die Hennen, soweit sie nicht an Schnupfen erkrankt waren, nach einiger Zeit die Legetätigkeit wieder aufnehmen würden. Diese Vermutungen trafen auch zu.

28 Tage nach der erstmaligen Behandlung glaubte ich annehmen zu können, daß die Mehrzahl der Hennen wieder eine normale Legeleistung erreicht habe und einer zweiten Behandlung ausgesetzt werden könnte.

Doch auch nun, am 26. November 1937, zeigten die Hennen unzulängliche Leistungen; etwa 70 % der Tiere hatten bereits 10 Tage nicht mehr gelegt, 30 % in dieser Zeit nur mäßige Leistungen gezeigt. Bei eingehender Untersuchung des ganzen Bestandes zeigte sich, daß nun im Gegensatz zu Versuch 4 etwa 70 % der Hennen an Schnupfen erkrankt waren.

Es wurde diese zweite Behandlung unter den vorliegenden Umständen durchgeführt, um zu überprüfen, ob

1. nach völliger Genesung der Hennen die Entwicklung des Eierstockes und somit das Wiedereinfsetzen der Legetätigkeit beschleunigt werden kann,

2. wie sich eine Gabe von 5 RE auf die Legetätigkeit auswirkt.

Zur Behandlung kamen nur solche Tiere, die 10 Tage vor der Behandlung nicht mehr gelegt oder in dieser Zeit schlechte Leistungen gezeigt hatten. Bei der Behandlung wurde der Gesundheitszustand einer jeden Henne festgestellt.

Aus dem Bestande von etwa 180 Hennen wurden 116 Hennen für den Versuch herausgezogen. 47 Tiere wurden mit 5 RE Prolan,

35 Hennen mit 12,5 RE behandelt und die restlichen 34 Hennen zur Kontrolle belassen.

Bei der Ausarbeitung des Versuches zeigte es sich, daß 86 Tiere vor dem Behandlungstage nicht gelegt, 30 Hennen vor diesem Tage nur mäßige Erträge gezeitigt hatten.

Das Wiedereinsetzen der Legetätigkeit.

Unter diesem Gesichtspunkt wurden 86 Hennen beobachtet, die 10 Tage vor der Behandlung nicht mehr gelegt hatten.

Tabelle 11 (zu Versuch 5).

Wiederbeginn der Legetätigkeit nach Prolanbehandlung.


Es hatten zu legen begonnen	Mit 5 RE behandelt 40 Hennen		Mit 12,5 RE behandelt 26 Hennen		Unbehandelt 20 Hennen	
	Hennen	%	Hennen	%	Hennen	%
27. Nov.	0	—	0	—	0	—
28. „	1	2,5	2	7,7	1	5
29. „	2	5,0	—	—	2	10
30. „	3	7,5	3	11,5	4	20
1. Dez.	—	—	—	—	—	—
2. „	4	10,0	4	15,5	5	25
3. „	7	17,5	7	26,0	—	—
4. „	8	20,0	10	37,6	6	30
5. „	9	22,5	—	—	—	—
6. „	13	32,5	12	45,4	—	—
7. „	15	40,0	—	—	7	35
8. „	18	45,5	—	—	9	45
9. „	—	—	13	50,0	—	—
10. „	19	47,5	14	53,2	—	—
11. „	20	50,0	15	57,2	—	—
12. „	—	—	—	—	—	—
13. „	21	52,5	17	65,0	—	—
14. „	23	57,5	—	—	—	—
15. „	—	—	19	72,8	—	—
16. „	26	65,0	21	80,6	10	50
17. „	—	—	—	—	—	—
18. „	29	72,5	24	92,3	—	—
19. „	—	—	—	—	—	—
20. „	30	75,0	—	—	12	60
21. „	32	80,0	—	—	—	—
22. „	—	—	—	—	—	—
23. „	33	82,5	—	—	—	—
24. „	—	—	—	—	—	—
25. „	34	85,0	—	—	—	—

a) Behandlung mit 12,5 RE:

26 behandelte Hennen sind mit 20 Kontrolltieren zu vergleichen. Wie aus Tabelle 11 und Abbildung 9 zu ersehen ist, beginnt das Wiedereinfsetzen der Legetätigkeit bei beiden Gruppen am 2. Tage, steigert sich auch für behandelte wie nichtbehandelte Tiere ziemlich gleichmäßig bis zum 12. Tage nach der Behandlung. Während in den nächsten 10 Tagen

Abbildung 9 (zu Versuch 5).

Wiederbeginn der Legetätigkeit nach Prolanbehandlung.



die Kontrollkurve auf der bereits erreichten Höhe stehen bleibt, steigt die Kurve der behandelten Tiere weiterhin an; die Kontrollkurve steigt erst vom 20. Tage nach dem Behandlungstage weiterhin an.

b) Behandlung mit 5 RE:

40 behandelte Hennen beginnen am 2. Tage nach der Behandlung zu legen, doch bedeutend spärlicher als die Kontrolltiere und die mit 12,5 RE behandelten Hennen. Am 15. Tage nach der Behandlung legen ebensoviele mit 5 RE behandelte Hennen wie Kontrollhennen; am 30. Tage nach der Behandlung legen aber bereits 85 % dieser Hennen, während erst 60 % der Kontrollhennen legen.

Die Legeleistung.

Bei Nichtberücksichtigung der Zahl der erkrankten Hennen in den einzelnen Gruppen läßt sich aus Tabelle 12 entnehmen:

I. Hennen, die vor der Behandlung nicht gelegt hatten.

Das Bild stimmt mit den früheren Erfahrungen überein.

Eine mit 5 RE behandelte Henne legte in 29 Tagen nach der Behandlung 2,35 Eier mehr als ein Kontrolltier.

Eine mit 12,5 RE behandelte Henne legte in 29 Tagen nach der Behandlung 3,52 Eier mehr als ein Kontrolltier.

II. Hennen, die vor der Behandlung mäßig gelegt hatten.

Auch hier tritt eine Prolanwirkung zu Tage. Doch der Unterschied zwischen den einzelnen Dosen ist gering.

Eine mit 5 RE behandelte Henne legte in 29 Tagen nach der Behandlung 1,83 Eier mehr als ein Kontrolltier.

Eine mit 12,5 RE behandelte Henne legte in 29 Tagen nach der Behandlung 2,35 Eier mehr als ein Kontrolltier.

Bei den beiden letzten Ergebnissen sind die Leistungsunterschiede vor und nach der Behandlung natürlich berücksichtigt worden.

Tabelle 12 (zu Versuch 5).

Die Legeleistung vor und nach Prolanbehandlung am 26. November 1937.

Do- fierung	Verhalten vor der Behandlung	Anzahl der Tiere	Erkrankte		Vor der Behandlung (10 Tage)		Nach der Behandlung (29 Tage)	
			Hennen	%	1 Henne in 10 Tage	100 Hennen pro Tag	1 Henne in 29 Tage	100 Hennen pro Tag
5 RE	nicht gelegt	40	30	75	—	—	8,6	29,65
	mäßig gelegt	7	5	71	4	40,0	16,28	56,17
12,5 RE	nicht gelegt	26	22	85	—	—	9,77	33,68
	mäßig gelegt	9	8	89	3,11	31,11	13,88	47,88
Kon- trollen	nicht gelegt	20	12	60	—	—	6,25	21,55
	mäßig gelegt	14	2	14	4,21	42,14	15,35	52,96

Da in diesem noch teils erkrankten Bestande die oben errechneten Werte auch von einer verschiedenen Anzahl kranker Tiere in den einzelnen Gruppen herrühren können, wurde an Hand der Aufzeichnungen über den Gesundheitszustand einer jeden Henne, die bei der Behandlung gemacht wurden, die Leistung in den einzelnen Gruppen mit dem Gesundheitszustand verglichen.

Aus diesem Vergleich ergab sich:

I. Hennen, die vor der Behandlung nicht gelegt hatten.

Bei den behandelten Tieren ist die Legeleistung der erkrankten Hennen immer erheblich schlechter als bei den gefunden Hennen. Dieser Unterschied ist für 5 RE und 12,5 RE etwa gleich.

Bei den Kontrolltieren zeigten die erkrankten Tiere bessere Leistungen.

II. Hennen, die vor der Behandlung mäßig gelegt hatten.

Zur Beurteilung dieser Ergebnisse muß berücksichtigt werden, daß immer wenig gesunde Hennen vielen kranken Hennen gegenüber standen.

Die mit 5 RE behandelten kranken Hennen legten vor und nach der Behandlung besser als die gefunden Hennen. Wahrscheinlich handelt es sich um leichte Erkrankungen, die lediglich die Symptome des Schnupfens auslösten, aber keine Störung des Allgemeinbefindens hervorriefen, die den Eierstock nachteilig hätten beeinflussen können. Die Leistungsdifferenz vor der Behandlung wird aber nach der Behandlung durch Leistungsanstieg bei den gefunden Hennen auf die Hälfte reduziert. Vielleicht ist hier die Prolanwirkung zu suchen.

Bei den mit 12,5 RE behandelten Hennen ist es gerade umgekehrt. Hier überwiegt bei weitem die Leistung der gefunden Hennen vor und nach der Behandlung im gleichen Verhältnis.

Bei den Kontrolltieren wechselt die bessere Leistung von den gefunden Hennen vor der Behandlung zu den kranken Hennen nach der Behandlung.

Beigefügte Abbildung 10 zeigt, daß bei den Hennen, die vor der Behandlung nicht gelegt hatten, die Legeleistung der mit 12,5 RE behandelten Hennen trotz größter Anzahl kranker Tiere am meisten angestiegen ist.

Bei den mit 5 RE behandelten Hennen zeigt sich die Prolanwirkung durch Vergleich mit den Kontrolltieren; doch ist der Erfolg schwächer als bei der Dosis 12,5 RE.

Für die Hennen, die vor der Behandlung mäßig gelegt hatten, ist der Leistungsanstieg bei den beiden Dosierungen gleich, doch spricht die

Tabelle 13 (zu Versuch 5).

Die Leistungen der erkrankten Tiere verglichen mit den Leistungen der gefunden Tiere vor und nach der Behandlung am 26. November 1937.

Dosis	Verhalten vor der Behandlung	Zustand der Hennen bei der Behandlung	Anzahl der Hennen	Vor der Behandlung		Nach der Behandlung	
				1 Henne in 10 Tagen	100 Hennen pro Tag	1 Henne in 29 Tagen	100 Hennen pro Tag
5 RE	nicht gelegt	krank	30	—	—	8,06	27,82
		nicht krank	10	—	—	10,2	35,17
	mäßig gelegt	krank	5	4,2	42,0	16,6	57,24
		nicht krank	2	3,5	35,0	15,5	53,45
12,5 RE	nicht gelegt	krank	22	—	—	9,44	32,79
		nicht krank	4	—	—	11,75	40,52
	mäßig gelegt	krank	8	2,88	28,75	12,75	43,97
		nicht krank	1	0,5	50,0	23,0	79,31
Kontrollen (nicht behandelt)	mäßig gelegt	krank	2	3,0	30,0	16,5	56,89
		nicht krank	12	4,42	44,17	15,16	52,31
	nicht gelegt	krank	12	—	—	7,0	24,14
		nicht krank	8	—	—	5,13	17,67

stärkere Erkrankung der mit 12,5 RE behandelten Hennen für die größere Wirksamkeit dieser Dosierung.

Bei den Kontrollhennen ist eine etwas geringere Leistungssteigerung gegeben, doch die Zahl der kranken Tiere ist sehr niedrig.

Mehrertrag an Eiern durch die Behandlung.

I. Abgelefen bei den Hennen, die vor der Behandlung nicht gelegt hatten.

40 Hennen, mit 5 RE behandelt, legten in 29 Tagen 344 Eier.
20 Kontrolltiere in der gleichen Zeit 125 Eier.

Es legte fomit eine behandelte Henne in 29 Tagen 2,35 Eier mehr als eine Kontrollhenne.

26 Hennen, mit 12,5 RE behandelt, legten in 29 Tagen 254 Eier.

Es legte fomit eine behandelte Henne in 29 Tagen nach der Behandlung 3,52 Eier mehr als eine Kontrollhenne.

Von den 66 behandelten Hennen waren 52 Tiere erkrankt, von den 2 mal 20 Kontrollhennen waren 2 mal 12 Hennen erkrankt.

Ergebnis:

66 behandelte Hennen legten bei einer Mehrererkrankung von 20 % in 29 Tagen 185 Eier mehr als eine entsprechende Anzahl Kontrollhennen.

II. Abgelefen bei den Hennen, die vor der Behandlung mäßig gelegt hatten.

7 Hennen, mit 5 RE behandelt, legten in 29 Tagen 114 Eier.
In 10 Tagen vor der Behandlung legten sie 28 Eier.

14 Kontrollen legten in der gleichen Zeit nach der Behandlung 215 Eier.

14 Kontrollen legten in der gleichen Zeit vor der Behandlung 59 Eier.

Es legte eine behandelte Henne in 29 Tagen nach der Behandlung 1,45 Eier mehr als eine Kontrollhenne.

9 Hennen, mit 12,5 RE behandelt, legten in 29 Tagen 125 Eier.
In 10 Tagen vor der Behandlung legten sie 28 Eier. Es legte eine behandelte Henne in 29 Tagen nach der Behandlung 1,74 Eier mehr als eine Kontrollhenne.

Von den 16 behandelten Hennen waren 13 Tiere erkrankt, von den 2 mal 14 Kontrollhennen waren 2 mal 2 Hennen erkrankt.

Ergebnis:

16 behandelte Hennen legten in 29 Tagen bei einer Mehrererkrankung von 66 % 23 Eier mehr als eine entsprechende Anzahl Kontrollhennen.

Abbildung 10 (zu Versuch 5).

Darstellung der Legeleistungen vor und nach der Behandlung sowie der Anzahl der erkrankten Hennen in %.

5 RE			12,5 RE			Kontrollen	
%	% Legeleistung nach der Behandlung	% Legeleistung vor der Behandlung	%	% Legeleistung nach der Behandlung	% Legeleistung vor der Behandlung	%	% Eier in derselben Zeit nach der Behandlung vor der Behandlung bei den Versuchstieren
Kranke			Kranke			Kranke	

I. Hennen, die vor der Behandlung nicht gelegt hatten.



II. Hennen, die vor der Behandlung mäßig gelegt hatten.



IV. Vergleichende Betrachtung der Versuchsergebnisse.

In allen Versuchen war die *Legetätigkeit* durch verschiedene schädigende Einflüsse, wie Unregelmäßigkeit in der Haltung, Fütterungsfehler, schädigende Witterungseinflüsse, Krankheiten und zuweilen auch durch nicht geklärte Ursachen *unterbrochen*.

Es hat sich gezeigt, daß bei anhaltender Schädigung eine Wiederaufnahme der Legetätigkeit nicht möglich ist und diese auch durch eine Hormonbehandlung keineswegs gesteigert werden kann. Erst wenn der schädigende Einfluß beseitigt ist, beginnt das Ovar neue Follikel

zu bilden, und nach Ablauf von einigen Tagen setzt die Legetätigkeit wieder ein, ganz unabhängig davon, ob eine Henne behandelt wurde oder nicht. Dementiprechend beginnt auch das Wiedereinsetzen der Legetätigkeit bei den behandelten wie nicht behandelten Hennen gleichmäßig.

Die Prolanwirkung zeigt sich in dem lebhafteren Wiedereinsetzen der Legetätigkeit wie in einem stärkeren Ansteigen der Leistungen.

Es ist anzunehmen, daß Prolan auf die Entwicklung der Eifollikel beschleunigend wirkt, nachdem die Erkrankung abgeklungen ist. Prolan ist also kein Heilmittel, unter dessen Wirkung der degenerierte Eierstock wieder leistungsfähig wird, sondern die Wirkung des Prolan beruht auf einem Reiz, der die in Entwicklung begriffenen Eier zu schnellerer Reifung und Loslösung bringt.

Besonders wirkungsvoll scheint diese Prolanwirkung bei Junghennen zu sein. In Versuch 2 konnten Junghennen, die das Legen eingestellt hatten, durch Prolanbehandlung innerhalb von 25 Tagen die Leistung der Kontrolltiere durchschnittlich um die Hälfte überbieten.

Die behandelten Zuchthennen im gleichen Versuch legten dagegen nur $\frac{1}{5}$ besser als die zugehörigen Kontrollen.

In beiden Fällen steigerten die behandelten Hennen ihre Legeleistung in 25 Tagen wieder auf durchschnittlich 60 %, was der Leistung eines normal legenden Stammes entspricht. Bei den Kontrolltieren konnte nur ein Tagesdurchschnitt von 35 % errechnet werden. Es haben diese Hennen wohl noch viele Tage gebraucht, um eine normale Durchschnittsleistung zu erreichen.

In Versuch 1, der bei Zuchthennen durchgeführt wurde, übersteigt die Leistung der behandelten Hennen in 18 Tagen die Leistung der Kontrollen um die Hälfte.

In Versuch 5 legen die Junghennen in 29 Tagen nur $\frac{1}{10}$ besser als die Kontrolltiere. Doch muß bei diesem Vergleich berücksichtigt werden, daß bei den Kontrollen zur Zeit der Behandlung um $\frac{1}{5}$ weniger kranke Tiere waren als bei den behandelten Hennen.

In der Mehrzahl wird die *nicht befriedigende Legeleistung* der hier zu besprechenden Hennen auf vorübergehende Umwelteinflüsse schädigender Natur zurückzuführen sein, so daß man von normal legenden Hennen sprechen kann, deren Legetätigkeit durch Schädigungen leichter Art vorübergehend beeinträchtigt ist. Auch bei diesen Hennen ist die Wirkung des Prolan ebenso zu erklären wie bei den Hennen, deren wahrscheinlich erhöhte Empfindlichkeit gegen Umwelteinflüsse die Legetätigkeit zum Stillstand brachte. Auch hier kann nur eine Prolan-

wirkung erwartet werde, wenn der Organismus keinen Schädigungen mehr ausgesetzt ist.

Durch Vergleich der Legeleistung vor der Behandlung mit den Ergebnissen nach der Behandlung konnte bei Kontrollen wie bei den behandelten Tieren festgestellt werden, ob die Hennen noch unter dem Einfluß einer auf den Eierstock wirkenden Schädigung standen.

Dies war in Versuch 4 bei den meisten Tieren der Fall. In allen anderen Versuchen stieg die Legeleistung der behandelten wie nicht-behandelten Hennen in der Zeit nach der Injektion wieder an. Dieses Ansteigen war aber bei den behandelten Hennen dieser Gruppen immer stärker als bei den entsprechenden Kontrollen, worin sich also die Prolanwirkung zeigt.

Es konnte durch Prolaninjektion eine durchschnittlich 45 % ige Legeleistung innerhalb von etwa 4 Wochen auf eine Tagesleistung von 65 % gesteigert werden. Bei den nichtbehandelten Hennen stiegen in den entsprechenden Zeitabschnitten die Leistungen von 45 % auf 55 % an.

Durch Prolanbehandlung war es in keinem Versuch möglich, die bereits gute Legeleistung der Hennen zu steigern. Im Gegenteil zeigten die Hennen nach ihrer Behandlung oft geringe Verschlechterung in der Legeleistung. Am deutlichsten zeigt dieses Ergebnis Versuch 3, bei dem es sich um sehr gute Leger handelt. Für Junghennen und Zuchthennen liegen keine Unterschiede vor, wohl bestimmt aber die verschiedene Größe der Prolandosis geringgradig das Ergebnis.

Bei der Behandlung von Hennen entstehen Schädigungen, auf die in dieser Arbeit schon verschiedentlich hingewiesen wurde. In manchen Versuchen traten diese Schädwirkungen deutlich in Erscheinung, während sie in anderen Untersuchungen nicht bemerkt wurden. So traten Schädigungen nur bei Hennen auf, die vor der Behandlung gut gelegt hatten und insbesondere dann, wenn sie mit 5 RE Prolan behandelt worden waren. Aus diesen Ergebnissen ist zu schließen, daß große Prolandosen, sofern sie fördernd auf die Legetätigkeit einwirken können, die durch die Behandlung entstehenden Schädwirkungen überdecken. Eine Erklärung dafür, daß nur gute Leger diese Schädwirkungen zeigen, gab schon Koch durch die Feststellung, daß das Ovar in verschiedenen Entwicklungsstadien verschieden empfindlich ist. Demzufolge ist anzunehmen, daß bei normal funktionierendem Eierstock die Empfindlichkeit gesteigert ist, während Hennen mit gestörter Legetätigkeit weniger empfindlich sind.

Urächlich kann für diese Schädlichkeiten die Behandlungsart sowie eine Kontraindikation des Prolan verantwortlich gemacht werden.

Da aber negative Leistungsergebnisse durch große Prolandoten beseitigt werden konnten, was bei Gaben von 5 RE nicht erreicht wurde, ist eine Schädigung durch Prolan auszuschließen. Es bleibt also bei der schon verschiedentlich erwähnten Schädigung durch die Behandlung. Doch ist diese sehr geringgradig.

Wie aus Versuch 2 und 5 hervorgeht, ist das Wiedereinsetzen der Legetätigkeit durch große Dosen Prolan am raschesten herbeizuführen. Besonders zeigt sich dies bei den Junghennen, wo Dosen von 100 RE und 25 RE im Verhältnis zu den kleineren Dosen schockartig wirken.

Es zeigen die Vergleiche:

- von 100 RE mit 12,5 RE in *Versuch 2*,
- von 25 RE mit 12,5 RE in *Versuch 1* und *Versuch 2*,
- von 5 RE mit 12,5 RE in *Versuch 5*,

daß 12,5 RE in allen Gegenüberstellungen die beste Gesamtleistung erzielte. Im Verhältnis zu 5 RE und den Kontrollen zeigten die mit 12,5 RE behandelten Hennen auch ein schnelleres Wiedereinsetzen der Legetätigkeit.

Die Legeleistungen erfahren überall da, wo Legestörungen durch Prolan beseitigt werden können, bei einer Behandlung mit 12,5 RE die größten Steigerungen. Die großen Dosen von 100 RE und 25 RE nähern sich nur bei den Hennen den Ergebnissen einer Behandlung mit 12,5 RE, deren Legetätigkeit eingestellt war, ein Umstand, der nur auf das plötzliche Einsetzen der Legetätigkeit bei Behandlung mit großen Dosen zurückzuführen ist.

Bei jeder medikamentösen Behandlung muß auf die *Wirtschaftlichkeit* besonderer Wert gelegt werden. Diese ist abhängig von dem Aufwand an Arbeitskraft und Arbeitszeit und insbesondere von den Kosten der zu verbrauchenden Arzneistoffe. Zudem ist die Behandlung einer geringen Anzahl von Tieren in der Regel nicht wirtschaftlich. Die gleichmäßige Behandlung eines größeren Bestandes kann bei weitgehendster Einsparung von Arbeitskraft und Arbeitszeit mit nicht zu teuren Arzneistoffen, sofern sie erfolgreich ist, ersprießlich sein.

Zur weitgehendsten Einsparung von Arbeitskraft und Arbeitszeit muß der Erfolg durch eine einmalige und gleichmäßige Behandlung herbeigeführt werden können. Es konnten entsprechend den einleitend geschilderten Arbeitsmethoden bei Beschränkung auf 4 Arbeitskräfte durchschnittlich 200 Hennen in einer Stunde behandelt werden. Zweckmäßig erwies sich eine Behandlung in den Abendstunden, da zu dieser Zeit mit dem schnelleren Arbeiten auch die geringste Störung der Hennen verbunden ist.

Zur möglichsten Beschränkung der Arzneikosten ist die Erkenntnis der sparsamsten Einverleibung sowie der wirksamsten Dosis erstrebenswert. Am geringsten ist der Verbrauch an Arzneistoffen bei der Injektion. Zur Feststellung der wirksamsten Prolandosis bei einer einmaligen Behandlung führte ich Injektionen mit 5 RE, 12,5 RE, 25 RE und 100 RE Prolan durch. Es zeigten sich bei einer Injektion von 12,5 RE Prolan immer die besten Ergebnisse. Diese Prolangabe, die schon Koch (9) als wirtschaftlich erklärte, konnte auch nach meinen Versuchen nicht durch eine andere ersetzt werden.

Der Preis für die geeignete Handelspackung Prolan ist zur Zeit für 500 RE 2,80 RM. Bei Verwendung dieser Packung, die für die Behandlung von 40 Hühnern ausreicht, kostet die Dosis von 12,5 RE, die sich als die wirkungsvollste erwiesen hat, je Henne 0,07 RM bei Bezug durch den Tierarzt. Dazu treten gegebenenfalls noch die Tierarztkosten für die Einspritzung, die nach Uebereinkommen festgesetzt werden. Die Gesamtkosten der Behandlung werden in größeren Beständen kaum 0,15 RM je Henne übersteigen. Die Behandlung ist demnach schon wirtschaftlich, wenn sie einen Mehrertrag von 2 Eiern je Henne ergibt, ein Gewinn, der in meinen Versuchen bei richtiger Anwendung in der Regel erheblich überschritten worden ist. Die Kosten der Behandlung werden sich den Erfordernissen der Wirtschaft anpassen.

V. Zusammenfassung.

Im Jahre 1937 wurden in verschiedenen staatlich anerkannten Geflügelzuchten Versuche zur Beeinflussung der Legeleistung bei Hühnern mit Prolan durchgeführt. Die Untersuchungen erstreckten sich über insgesamt 1973 Hennen, von denen 1024 behandelt und 949 als Kontrollhennen verglichen wurden.

Geeignet für eine Prolanbehandlung sind vor allem Hennen, deren Legetätigkeit ganz eingestellt war, sofern die Störungsursache zur Zeit der Behandlung beseitigt ist.

Bei solchen Hennen konnte innerhalb von 4 Wochen die Legetätigkeit gesteigert werden, und zwar:

A. Bei Junghennen

durch Injektion von	5,0 RE Prolan	um durchschnittlich	3 Eier
" "	12,5 RE	" "	8 "
" "	100,0 RE	" "	7 "

B. Bei Zuchthennen

durch Injektion von	12,5 RE Prolan	um durchschnittlich	3 Eier
" "	25,0 RE	" "	5 "

Mäßige Leistungen bei Hennen, die infolge von schädigenden Umwelteinflüssen auftraten, konnten in etwa 4 Wochen gesteigert werden, und zwar:

A. Bei Junghennen

durch Injektion von	5,0 RE Prolan	praktisch nicht	(0,05 Eier)
" "	12,5 RE	"	um durchschnittlich 3 Eier
" "	100,0 RE	" "	2 "

B. Bei Zuchthennen

durch Injektion von 12,5 RE Prolan um durchschnittlich 3 Eier

„ „ „ 25,0 RE „ „ „ 2 „

Normal legende Hennen waren in ihrer Legetätigkeit mit den Prolandosen, die bei Nichtlegerinnen wirksam waren, nicht günstig zu beeinflussen.

Die Durchführung der Versuche in praktischen Zuchtbetrieben zeigte, daß die Prolanbehandlung mit der ermittelten Dosis *wirtschaftlich* angewandt werden kann

VI. Literatur.

Eine Zusammenstellung der gesamten Literatur findet sich bei Koch, W. (10): Die praktische Anwendung von Hormonen bei Nutztieren. Erg. Biol. 15, 1—64, 1938.

1. Berblinger, W.: Die Wechselbeziehungen zwischen Hypophyse und Keimdrüsen. Erg. der Vitamin- u. Hormonforsch., Bd. 1, 1938, Leipzig.
2. Domm, L. V.: Precocious development of sexual characters in the fowl by homeoplastic hypophyseal implants. I. The male. Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 29, 308—309, 1931.
3. Domm, L. V.: Precocious development of sexual characters in the fowl by homeoplastic hypophyseal implants. II. The female. Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 29, 310—312, 1931.
4. Euler, H. v., und B. Zondek: Skand. Arch. Physiol. (D.) 1934, 232.
5. Euler, H. v.: Bedeutung der Wirkstoffe (Ergone), Enzyme und Hilfsstoffe im Zellenleben. Erg. der Vitamin- und Hormonforsch., Bd. 1, 1938, Leipzig.
6. Kamenicek, L. F.: Beeinflussung der Geschlechtsentwicklung der Hühner durch gonadotrope Substanz des Gravidenharns. Z. f. Züchtung 32, 2, 153—298, 1935.
7. Koch, W.: Einfluß von Prolan auf die Legetätigkeit der Vögel. I. Versuche an Hühnern, deren Legetätigkeit gestört war. Klin. Wöchr. 1934, II, 1647.
8. Koch, W.: Einfluß von Prolan auf die Legetätigkeit der Vögel. II. Die Beeinflussung normal legender Hennen. Klin. Wöchr. 1935, II, 1850.
9. Koch, W.: Die hormonale Beeinflussung der Legeleistung durch Prolan. Z. f. Z. B. 36, 259, 1936.
10. Koch, W.: Die praktische Anwendung von Hormonen bei Nutztieren. Erg. Biol. 15, 1—64, 1938.
11. Noether, P.: Wirkung der Extrakte des Hypophysenvorderlappens und aus Schwangerenharn auf die Ovulation der Hühner. Naunyn-Schmiedebergs Arch. 150, 326—331, 1930.
12. Noether, P.: Wirkung von Hypophysenvorderlappen auf die Ovulation des Huhnes. Naunyn-Schmiedebergs Arch. 160, 369—474, 1931.
13. Wehner, A.: Wirkung des Hypophysenvorderlappenpräparates „Prolan“. Dtsch. tierärztl. Wöchr. 1933, I, 24.

Lebenslauf.

Am 20. August 1913 wurde ich, Walter Eufinger, in Oberlahnstein am Rhein als Sohn des Volksschullehrers Fritz Eufinger und seiner Ehefrau Maria, geborene Schepping, geboren. 4 Jahre besuchte ich in Oberlahnstein die Volksschule und trat Ostern 1924 in das dortige humanistische Gymnasium über, wo ich am 16. März 1933 das Abitur ablegte. Anschließend meldete ich mich zum freiwilligen Arbeitsdienst für Abiturienten, aus dem ich im Herbst 1933 entlassen wurde. Darauf widmete ich mich dem Studium der Tierheilkunde an der tierärztlichen Fakultät der Universität München und verbrachte daselbst meine gesamte Studienzeit vom 1. November 1933 bis zum 28. Februar 1938. Im Februar 1935 bestand ich den naturwissenschaftlichen, im Juni 1935 den anatomischen Abschnitt der tierärztlichen Vorprüfung. Am 4. April 1938 begann ich mit der Ablegung der tierärztlichen Prüfung, die ich am 19. Juni 1938 beendete.
